

# Dorngrasmücke

*Sylvia communis*



vogelwarte.ch



## Massnahmen:

- Gehölze selektiv pflegen; Pflegeziel: Dichte, niedrige Gehölze
- Säume anlegen und erhalten und abschnittsweise durch Rotationsmahd pflegen
- Ältere Stadien von Buntbrachen erhalten, auch Sukzessionsstadien in Richtung Gebüsch zulassen
- Niederhecken und dichte Gebüsche pflanzen bzw. erhalten, insbesondere auch dichte Brombeerbestände, z. B. in Weiden, dulden

## Leitart für:

Offene und halboffene Kulturlandschaften; öAF-Typen: Buntbrachen, Hecken

## Lebensraum:

Ältere Stadien von Buntbrachen, dichte Niederhecken, Brombeergestrüpp, verbuschende, grössere Ruderalflächen



# Dorngrasmücke

*Sylvia communis*



vogelwarte.ch



**Merkmale:** Länge 14 cm; Kopfkappe grau, Unterseite hellgrau mit weisser Kehle; die rostbraunen Federränder an den Flügeln sind kennzeichnend

**Ähnliche Arten:** Klappergrasmücke: Ohne rotbraune Federränder an den Flügeln

**Verhalten:** Eine Jahresbrut; Nest in Stauden oder niedrigen Sträuchern, oft Brennnesseln oder Brombeeren; in der Regel nur 30–50 cm über Boden; Legebeginn meist Anfang Mai, bei verspäteten Bruten bis Juli; Brutdauer und Nestlingszeit insgesamt 20–30 Tage; Gebüschschlüpfer; Gesang auf Singwarten und im Singflug; oft werden mehr Reviere gebildet als Brutpaare vorhanden sind, da zumindest in gewissen Regionen ein grosser Männchen-Überschuss herrscht

**Nahrung:** Vor allem kleine, weichhäutige Insekten

**Lautäusserung:** Rufe: «teck, trrt, woid-woid-woid»; Gesang: Beginnt mit trillernder, rauer Silbe und ist in einen ersten leiseren Teil und einen zweiten lauterer gegliedert; letzterer oft auch allein zu hören


**Raumverhalten:** Langstreckenzieher; Revierrößen sehr unterschiedlich und während der Brutzeit stark variierend; Höchstdichten in Optimalgebieten bis 11 Reviere/10ha; doch meist geringer als 5 Reviere/10ha

**Rote Liste:** Gefährdet



Niedriges Brombeergestrüpp ist bei der Dorngrasmücke für die Nestanlage besonders beliebt.

**Fotoautor** Artbild, Lebensraumbild und Zusatzbild: Markus Jenny, Fehraltorf



Präsenz in der Schweiz

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.

Brutzeit