

Plattbauch

Libellula depressa



vogelwarte.ch



Leitart für:

Halboffene und offene Kulturlandschaft mit grösserem Gewässeranteil; öAF-Typ: Gewässer

Lebensraum:

Stark besonnte Pionierweiher und -tümpel

Massnahmen:

- Ufer von Tümpeln und Teichen periodisch in den Pionierzustand zurückversetzen
- Flache, kleinere Tümpel und Teiche anlegen bzw. erhalten



Plattbauch

Libellula depressa



vogelwarte.ch



Merkmale: Flügelspannweite 5-7 cm; Hinterleib kennzeichnend platt, kurz und breit; bei älteren M schön hellblau bereift, bei W und jungen M gelbbraun; an der Basis der Flügel liegt ein grosser dreieckiger «Fleck».

Ähnliche Arten: Vierfleck und Spitzenfleck: Ähnlich gefärbt, aber viel schlanker; Blaupfeilarten: Ebenfalls schlanker, der braune Fleck an der Flügelbasis fehlt

Verhalten: Eier werden über sehr seichten, warmen Wasserstellen aus dem Flug mit wippenden Bewegungen abgeworfen; Larven wärmeliebend, leben deshalb in der ufernahen Flachwasserzone auf weichen Böden; die Paarung des Plattbauches dauert nur sehr kurz (ca. 1 Min.); bei der Eiablage bewacht das M das W aus der Luft

Nahrung: Larven: Wasserinsekten; Erwachsene: Kleine Insekten, vornehmlich Mücken und Fliegen

Raumverhalten: Weit umherstreifend

Rote Liste: Nicht gefährdet



Weibchen

Fotoautoren Artbild und Zusatzbild: Urs Lustenberger, Triengen; Lebensraumbild: Markus Jenny, Fehraltorf



Erwachsene

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------

Larve

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------