

Silber-Scheckenfalter

Melitaea diamina



vogelwarte.ch



Leitart für:

Moorlandschaften; öAF-Typen: Extensiv genutzte Wiesen, Streuwiesen

Lebensraum:

Feuchtwiesen und Streuwiesen mit Baldrian, die unvollständig genutzt werden oder reich an Säumen sind; im Bergland auch trockenere Magerwiesen

Massnahmen:

- Angebot an Nektar-Saugpflanzen während der ganzen Flugzeit sicherstellen (besonders beliebt: gelbe und violette Korbblütler)
- In Streuwiesen: Mahd ab Mitte September oder alle zwei Jahre alternierend (Rotationsmahd)
- Besiedelte, trockenere Bergwiesen: Mahd ab Juli
- Säume und Altgrasstreifen (vor allem solche mit Baldrian) abwechselnd das ganze Jahr stehen lassen, Extensivgrünland neu schaffen bzw. erhalten und vernetzen



Silber-Scheckenfalter

Melitaea diamina



vogelwarte.ch



Merkmale: Vorderflügelänge 1,8–2 cm; Oberseite überwiegend braun, mit orangen Fleckenreihen, v.a. im Vorderflügel; auf der Hinterflügelunterseite nahe am Rand eine Reihe trüb-oranger Felder, die breit schwarz eingefasst sind; in jedem davon liegt ein deutlicher brauner Punkt.

Ähnliche Arten: Auch andere Scheckenfalter können so dunkel gezeichnet sein; ihnen fehlen aber die trüb-orangen, schwarz eingefassten Felder mit den schwarzen Punkten

Verhalten: Eine Generation; Eier werden als gelbliche Haufen an die Blattunterseite der Nahrungspflanzen gelegt; Raupen leben vorerst gemeinsam in Raupennestern; sie überwintern in diesen gemeinsam oder aber zwischen dünnen Blättern der Streuschicht; nach der Überwinterung werden sie zu Einzelgängern und verpuppen sich an trockenen Pflanzenteilen in Bodennähe

Nahrung: Raupen: Gewöhnlicher Baldrian, Sumpf-Baldrian; Falter: Gelbe Korbblütler wie Arnika oder Sumpfpippau; violette Blüten z. B. Sumpf-Kratzdistel, Witwenblumen, Flockenblumen


Raumverhalten: Standorttreu, entlang geeigneter Strukturen können Distanzen bis 2 km überwunden werden; Art mit geringen Flächenansprüchen (1–5 ha)

Rote Liste: Gefährdet



Die Oberseite des Baldrian-Scheckenfalters ist viel dunkler als bei den meisten verwandten Arten

Fotoautoren Artbild: Niklaus Zbinden, Sursee; Lebensraumbild: Roman Graf, Luzern; Zusatzbild: Julian Alps, Slowenien



Präsenz Falter
 Präsenz Raupe (oben)
 Präsenz Puppe (unten)

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |