



# Schwerpunktgebiete für Bodenbrüter Nord- und Mittelbünden

## Untersuchungsgebiet Cuolms da Breil

### 6 Kerngebiet Cuolms da Breil



#### Kerngebiete und Einzelbeobachtungen:



**Gemeinde(n):** Breil

**Region:** Surselva

**Abdeckung mit Verträgen<sup>4</sup> (2012):** 18 %

Revierzahl, geschätzt:

Revierdichte im Untersuchungsgebiet geschätzt (Rev./10ha):

6 Cuolms da Breil			
BRK	BAP	FEL	ALLE
8	5	1	14
0.3	0.2	0.04	

Im UG Cuolms da Breil siedelt das Braunkehlchen in mässiger Dichte (an 34. Stelle aller 66 UG). Die Braunkehlchen von Breil fassen wir mit jenen von Vuorz und Andiaast zur Metapopulation „Surselva Nordflanke“ zusammen. Im UG Cuolms da Breil fanden wir 57% der Braunkehlchenreviere der Surselva Nordflanke. Das Gebiet ist also sehr wichtig für den Erhalt der Art in dieser Region

Vom Baumpieper und von der Feldlerche ist Cuolms da Breil nur spärlich besiedelt

Die Abdeckung mit für den Bodenbrüterschutz geeigneten Verträgen ist gering, zusätzliche Vertragsabschlüsse sind sehr erwünscht.

<sup>4</sup> Mit einem für Bodenbrüter geeigneten Schnitzeitpunkt