Azuré bleu-nacré

Polyommatus coridon

vogelwarte.ch FiBL

Mesures:

- Garantir la présence des plantes-hôtes des chenilles (hippocrépide à toupet)
- Entre début juillet et septembre, garantir la présence des plantes nectarifères; sont particulièrement recherchées: marjolaine, lotier corniculé, centaurée scabieuse, chardons
- Prairies: utiliser extensivement (fauche tardive en général dès le 1er juillet)
- Pâturages: pâturer extensivement (sans engrais, densité de bétail peu élevée). Cependant, la surface doit être bien pâturée avant l'hiver (sur un minimum de 90 % de la surface).
- Renoncer à la fumure dans les zones de vol, éviter tout impact dû à la fumure

Espèce caractéristique pour:

Paysage rural des étages montagnard et subalpin; types de SCE: prairies extensives, pâturages extensifs

Habitat:

Herbages maigres et clairsemés avec hippocrépide à toupet, fauchés/pâturés tardivement; souvent près des chemins dans des talus à végétation clairsemée

Azuré bleu-nacré

Polyommatus coridon

vogelwarte.ch FiBL

Description: Ailes antérieures longues d'env. 2 cm; mâle: dessus bleu vert argenté; femelle: dessus brun, à petites taches orange pâle sur les ailes postérieures, dessous des ailes ponctué de noir chez les deux sexes; franges tachetées chez les deux sexes

Confusions possibles: Pas de confusion possible chez le mâle (teintes argentées); femelle ressemblant à celle de l'azuré bleu céleste, mais taches orange sur le dessus plus intenses chez cette dernière

Mode de vie: Une génération; œufs déposés près des racines de la plante-hôte; les chenilles éclosent dès avril, ne se nourrissent que la nuit et se cachent la journée; les papillons se reposent en groupes et s'abreuvent volontiers aux endroits détrempés ou humides

Nourriture: Chenilles: hippocrépide à toupet et coronille bigarrée; papillons: recherchent surtout le nectar des centaurées, des cirses et de la marjolaine

Comportement territorial: Fidèle au site; peut couvrir des distances jusqu'à 2 km le long de structures adéquates; souvent en populations très denses; peu exigeant quant à la taille de son espace vital (1–5 ha)

Liste rouge: Vulnérable

L'hippocrépide à toupet, plante-hôte des chenilles

Auteurs des photos *Photo de l'espèce: Urs Lustenberger, Triengen; Photo de l'habitat: Roman Graf, Lucerne; Photo supplémentaire: www.floracyberia.net*



	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Présence du papillon												
Présence de la chenille (haut)												
Présence de la chrysalide (bas)												