Bruant ortolan

Emberiza hortulana

vogelwarte.ch FiBL

Mesures:

- Favoriser une structure en mosaïque fine du paysage avec des milieux extensifs, cultures d'avoine, parcelles de vignes et surfaces inexploitées
- Maintenir les pelouses steppiques; intervenir en cas de risque d'embuissonnement
- Aménager et maintenir des structures d'ourlet, les entretenir par des fauches alternées
- Maintenir ou laisser venir des buissons denses, en particulier de ronces (p. ex. dans les vignes)
- Aménager de telles structures dans les vignobles, le plus densément possible, également en périphérie de localités

Espèce caractéristique pour:

Paysage rural semi-ouvert, richement structuré

Habitat:

Pelouses steppiques et paysages agricoles traditionnels, richement structurés avec champs d'avoine, bosquets champêtres, vignobles, vergers, ourlets, etc.; seulement dans les régions climatiquement favorables, sèches et chaudes

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

vogelwarte.ch FiBL

Description: Taille: 15–16,5 cm; mâle: ventre brun orangé, poitrine et tête grises, dessus brun sable, fortement strié; la moustache jaune pâle séparée en trois ainsi que le cercle orbital jaune sont très caractéristiques; femelle: même coloration en plus pâle
Confusions possibles: Bruant jaune (femelle): croupion brun roux; bruant zizi (femelle): côtés de la tête striés
Mode de vie: Une couvée par année (rarement deux); nid construit dans des champs de céréales ou autres dont la végétation n'est pas trop haute; début de la ponte début mai; couvaison et élevage des jeunes 25–28 jours; oiseau très farouche et sensible aux dérangements dans le territoire de ponte et après que les petits aient quitté le nid
Nourriture: Oisillons: principalement insectes et araignées; adultes: également des graines pendant l'hiver
Chant, cri: Appel: « piyièp » ou « yup »; chant rappelant celui du bruant jaune, mais se terminant sur un son prolongé, beaucoup plus bas que les précédents: « hui-hui-hui-hui-hui-drûh »
Comportement territorial: Migrateur au long cours; dans les pelouses steppiques valaisannes, la densité de population atteignait autrefois 2,7 couples par ha; il a presque complètement disparu aujourd'hui; des groupes de couples nichaient proches les uns des autres, alors que des territoires restaient inoccupés entre les deux
Liste rouge: Vulnérable

Auteurs des photos *Photo de l'espèce: Markus Varesvuo, Helsinki (Fi); Photo de l'habitat: Niklaus Zbinden, Sursee*



	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Présence en Suisse												
Période de reproduction												