

News

Purpurreiher-Brut am Neuenburgersee

starker Einflug mehrerer
Limikolenarten

wahrscheinliche Brut
von Bienenfressern im
Kanton Zürich

singender Brachpieper
in Graubünden



*Héron pourpré nicheur
au lac de Neuchâtel*

*Invasion de plusieurs
espèces de limicoles*

*Guêpier probablement
nicheur dans le canton
de Zurich*

*Pipit rousseline can-
tonné dans les Grisons*

Meteo

Die Temperaturwerte lagen im März im Durchschnitt. Der Monat war in weiten Teilen des Landes niederschlagsarm und überdurchschnittlich sonnig.

Das Aprilwetter war typisch wechselhaft mit allerdings unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Der Mai zeigte sich meist wechselhaft mit z.T. starken Regen- bzw. Schneefällen zu Monatsbeginn. Die eher tiefen Temperaturen und späten Schneefälle sorgten dafür, dass in den Bergen Ende Monat noch überdurchschnittlich viel Schnee lag.

Im Juni herrschte auf der Alpennordseite meist wechselhaftes Wetter mit sehr hohen Niederschlagswerten zu Monatsbeginn. Auf der Alpensüdseite war es extrem trocken und warm.

Die Juliwerte lagen im langjährigen Durchschnitt. Auffällig war eine kalte Periode vom 9.-14. Juli. In dieser Zeit fiel auch der Hauptteil des Niederschlags.

En mars, les températures furent dans la moyenne. Le mois fut pauvre en précipitations et très ensoleillé dans la plupart des régions.

Fidèle à sa réputation, avril fut très changeant, mais avec des précipitations en dessous de la moyenne.

Mai fut lui aussi changeant avec des pluies abondantes, voire des chutes de neige au début du mois. A cause des températures plutôt basses et des chutes de neige tardives, il y avait encore beaucoup de neige en montagne à la fin du mois.

Au nord des Alpes, juin se révéla généralement instable et richement arrosé au début du mois. Le sud des Alpes bénéficia d'un temps chaud et extrêmement sec.


Les valeurs de juillet furent dans la norme. On nota une période plus froide entre le 9 et le 14 juillet. La plus grande partie des précipitations tombèrent pendant ces quelques jours.

	Basel-Binningen			Bern-Liebfeld			Davos-Dorf			Engelberg			Genève-Cointrin			
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	
März	81	101	0.0	73	100	0.1	27	118	0.3	100	97	0.0	87	118	0.2	<i>mars</i>
April	30	99	1.4	51	99	1.4	51	106	1.4	78	114	1.4	57	110	1.6	<i>avril</i>
Mai	61	121	0.0	89	124	0.2	65	100	-0.5	120	101	-0.6	66	138	0.6	<i>mai</i>
Juni	81	105	1.2	92	94	1.2	86	109	1.0	141	98	0.9	80	127	2.1	<i>juin</i>
Juli	90	96	0.7	132	98	0.3	72	86	0.7	83	95	0.7	154	102	0.7	<i>juillet</i>

	La Chaux-de-Fonds			Locarno-Monti			Sion			St. Gallen			Zürich			
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	
März	66	96	0.0	45	92	0.4	24	122	0.9	183	143	-0.1	97	131	0.2	<i>mars</i>
April	56	93	1.3	127	91	0.7	29	102	1.7	68	124	1.8	53	129	1.8	<i>avril</i>
Mai	42	129	-0.1	97	122	0.3	74	115	0.6	116	119	-0.2	167	125	-0.2	<i>mai</i>
Juni	94	106	1.4	16	120	3.0	104	104	1.7	107	95	1.3	112	105	1.2	<i>juin</i>
Juli	60	93	0.4	116	96	1.1	71	96	0.8	97	95	0.5	101	106	0.2	<i>juillet</i>

N = Niederschlagsmenge, in % der Norm
S = Sonnenscheindauer, in % der Norm
T = Temperatur, Abweichung von der Norm

*N = précipitations, % de la norme
S = ensoleillement, % de la norme
T = température, différence de la norme*



Dieses Bulletin wurde auf der Basis von 76 231 computerefassten Meldungen erstellt, wovon uns 64% via IDEXT übermittelt wurden. Ganz herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben!

Abkürzungen:

SOPM = Summe der Ortspentadenmaxima. Ohne andere Angabe bezieht sich diese auf die Monate März bis Juni.

Ce bulletin a été réalisé sur la base de 76 231 données informatisées, dont 64% nous sont parvenues par IDEXT. Un grand merci à tous ceux qui ont participé!

Abréviation:

SOPM = Somme des maxima par pentade et par lieu. Sauf indication contraire, se rapporte à la période allant de mars à juin.

Beobachtungen Observations

Sternaucher: Starkes Auftreten mit Beobachtungen bis im Mai: bis 27.5. 1-10 Ind. Préverenges VD und St-Sulpice VD (div. Beob.), bis 24.5. 1 Ind. Weissenau BE (R.Hauri), 11.5. 2 Ind. Jona SG (A.Täschler), 2.5. 3 Ind. Chablais de Cudrefin VD (P.Lustenberger). Neue Höchstzahl bei der SOPM=294 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=61 Ind.). Im Sommer 1 Ind. am 1./7./8./20./23.7. Yverdon VD und Champ-Pittet VD (E.Morard, E.Bernardi, O.Jean-Petit-Matile).

Prachtaucher: Starkes Auftreten mit Beobachtungen bis im Mai: bis 18.5. 1-2 Ind. zwischen Yvonand VD und Autavaux FR (P.Rapin, F.Schneider), 11.5. 12 Ind., 17.5. mind. 5 Ind. Kesswil TG (H.Leuzinger). Neue Höchstzahl bei der SOPM=308 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=191 Ind.).

Rothalstaucher: Viele Beobachtungen vom Genfer-, Boden- und Zürichsee sowie von den Bolle di Magadino TI. Letzte Beobachtungen: 25.5.: 1 Ind. Hombrechtikon ZH (M.Widmer) und 1 Ind. Kesswil TG (H.Leuzinger).

Ohrentaucher: 17./22./29./31.3. und 3./6.4. 1 Ind. Genève GE (B.Piot, C.Guex), 26.3. und 9.-10.4. 1 Ind. Hagneckdelta BE (div. Beob.), 20.3. 1 Ind. Uttwil SG (A.Schneeberger), 26.3. 2 Ind. Lachen SZ (L.Hüppin), 28.3. 1 Ind. Lugin F (R.Jordan), 16./18.4. 1 Ind. Kesswil TG (C.Beerli, A.Weiss), 28.4. 1 Ind. Les Grangettes VD (M.Burkhardt, J.-C.Tièche).

Schwarzhalstaucher: Brutnachweise von je einem Paar: Ägelsee TG (H.Leuzinger, W.Greminger), Weissenau BE (P.Blaser, R.Hauri), Kaltbrunner Riet SG (D.Marques).

Kormoran: Am Fanel 60 Nester mit mind. 39 Gelegen (P.Rapin, J.Hassler, P.Mosimann-Kampe).

Rohrdommel: Einige Aprilbeobachtungen: 1.4. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (M.Spiess), 3./4./8./10.4. 1 Ind. Sionnet GE (div. Beob.), 15.4. 1 Ind. Wauwilermoos LU (J.Lingg), 17.4. 1 Ind. Chavornay VD und 1 Ind. Demanio di Gudo TI (C.Baumberger, R.Spocci), danach letzte Beobachtung: 26.4. 1 Ind. Saint-Louis F (C.Katzenmaier). 25.3. 1 Ind. tot unter einer Stromleitung Aigle VD (A.Schneeberger).

Plongeon catmarin: *beaucoup de données, avec des séjours jusqu'en mai: 1-10 ind. jusqu'au 27.5. Préverenges VD et St-Sulpice VD (div. obs.), 1 ind. jusqu'au 24.5. Weissenau BE (R.Hauri), 11.5. 2 ind. Jona SG (A.Täschler), 2.5. 3 ind. Chablais de Cudrefin (P.Lustenberger). Nouvelle SOPM record: 294 ind. (moyenne¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=61 ind.). En été, 1 ind. les 1./7./8./20./23.7. Yverdon VD et Champ-Pittet VD (E.Morard, E.Bernardi, O.Jean-Petit-Matile).*

Plongeon arctique: *beaucoup de données, avec des séjours jusqu'en mai: 1-2 ind. entre Yvonand VD et Autavaux FR jusqu'au 18.5. (P.Rapin, F.Schneider), 11.5. 12 ind., 17.5. min. 5 ind. Kesswil TG (H.Leuzinger). Nouvelle SOPM record: 308 ind. (moyenne¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=191 ind.).*

Grèbe jougris: *beaucoup de données des lacs Léman, de Constance, de Zürich et des Bolle di Magadino TI. Derniers le 25.5.: 1 ind. Hombrechtikon ZH (M.Widmer) et 1 ind. Kesswil TG (H.Leuzinger).*

Grèbe esclavon: *17./22./29./31.3. puis 3./6.4. 1 ind. Genève GE (B.Piot, C.Guex), 26.3. puis 9.-10.4. 1 ind. Hagneckdelta BE (div. obs.), 20.3. 1 ind. Uttwil SG (A.Schneeberger), 26.3. 2 ind. Lachen SZ (L.Hüppin), 28.3. 1 ind. Lugin F (R.Jordan), 16./18.4. 1 ind. Kesswil TG (C.Beerli, A.Weiss), et 28.4. 1 ind. Les Grangettes VD (M.Burkhardt, J.-C.Tièche).*

Grèbe à cou noir: *nidifications certaines au Ägelsee TG (H.Leuzinger, W.Greminger), Weissenau BE (P.Blaser, R.Hauri), Kaltbrunner Riet SG (D.Marques).*

Grand Cormoran: *au Fanel BE, 60 nids avec au moins 39 pontes (P.Rapin, J.Hassler, P.Mosimann-Kampe).*

Butor étoilé: *quelques données en avril: 1.4. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (M.Spiess), 3./4./8./10.4. 1 ind. Sionnet GE (div. obs.), 15.4. 1 ind. Wauwilermoos LU (J.Lingg), 17.4. 1 ind. Chavornay VD et 1 ind. Demanio di Gudo TI (C.Baumberger, R.Spocci), et dernier le 26.4. à Saint-Louis F (C.Katzenmaier). 25.3. 1 ind. trouvé mort suite à une collision avec une ligne électrique à Aigle VD (A.Schneeberger).*

Rallenreiherr: Überdurchschnittliches Auftreten, SOPM=23 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=13 Ind.); 28.4. 1 Ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon), 2./8./10.5. 1 Ind. Thun BE (M.Wettstein), 6./8./9./11./14./23.5. 1 Ind. Teppes de Verbois GE (P.Blaser, R.Hauri u.a.), 7./8./11./12./15./17.5. 1 Ind. Mauensee LU (R.Hardegger, P.Kunz u.a.), 7./14./17.5. 1 Ind. Chatzensee ZH (P.Walser, R.Hangartner, M.Ehrengruber), 11.5. 1 Ind. Agarn/Leuk VS (L.Maumary, A.Gerber), 19.5. 1 Ind. Grandson VD (F.Banderet) und 1 Ind. Auried FR (A.Kilchör), 19./20./26./27.5. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (K.Anderegg, A.Täschler, H.Geisser), 27.5. 1 Ind. Wädenswil ZH (K.&L.Felix), 2.-4.6. 1 Ind. Fully VS (B.Posse), 21./25.6. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (F.Schneider, P.Mosimann-Kampe).

Kuhreiherr: 17.4. 1 Ind. Leuk VS (J.-M.Duflon), 18.4. 2 Ind. Agarn VS (E.Morard), 27.4. 2 Ind. Magadino TI (C.Foletti, M.Retter), 28.4. 1 Ind. Préverenges VD (E.Bernardi, J.Bruezière, L.Maumary, E.Morard), 30.4. 1 Ind. Gland VD (L.Lücker), 30.4. 1 Ind. Les Grangettes VD (L.Maumary)

Seidenreiherr: Durchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=259 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=234 Ind.); u.a. 18.5. 29 Ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (A. Ingold, P. Jascur), neue Höchstzahl für die Schweiz.


Purpureiherr: Zwei Bruten, wovon mind. eine erfolgreiche, am Südufer des Neuenburgersees (P. Rapin, M.Antoniazza).

Crabier chevelu: passage au-dessus de la moyenne, SOPM=23 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=13 ind.); 28.4. 1 ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon), 2./8./10.5. 1 ind. Thun BE (M.Wettstein), 6./8./9./11./14./23.5. 1 ind. Teppes de Verbois GE (P.Blaser, R.Hauri et al.), 7./8./11./12./15./17.5. 1 ind. Mauensee LU (R.Hardegger, P.Kunz et al.), 7./14./17.5. 1 ind. Chatzensee ZH (P.Walser, R.Hangartner, M.Ehrengruber), 11.5. 1 ind. Agarn/Leuk VS (L.Maumary, A.Gerber), 19.5. 1 ind. Grandson VD (F.Banderet) et 1 ind. Auried FR (A.Kilchör), 19./20./26./27.5. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (K.Anderegg, A.Täschler, H.Geisser), 27.5. 1 ind. Wädenswil ZH (K.&L.Felix), 2.-4.6. 1 ind. Fully VS (B.Posse), 21./25.6. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (F.Schneider, P.Mosimann-Kampe).

Héron gardebœufs: 17.4. 1 ind. Leuk VS (J.-M.Duflon), 18.4. 2 ind. Agarn VS (E.Morard), 27.4. 2 ind. Magadino TI (C.Foletti, M.Retter), 28.4. 1 ind. Préverenges VD (E.Bernardi, J.Bruezière, L.Maumary, E.Morard), 30.4. 1 ind. Gland VD (L.Lücker), 30.4. 1 ind. Les Grangettes VD (L.Maumary)

Aigrette garzette: passage dans la moyenne. SOPM=259 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=234 ind.); à noter 18.5. 29 ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (A. Ingold, P. Jascur), nouveau record pour la Suisse.

Héron pourpré: deux couples cantonnés sur la rive sud du Lac de Neuchâtel, dont un au moins niche avec succès (P. Rapin, M.Antoniazza).



Schwarzstorch: Beobachtungsorte (März bis Juni). Maximalzahl pro Kilometerquadrat.

Cigogne noire: sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique.

Schwarzstorch: Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=50 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=29 Ind.). U.a. Übersommerung von 2 ad. Ex. im Kanton Luzern (Beob. zwischen 12.4. und 19.7.), allerdings ohne Anzeichen auf eine mögliche Brut (div. Beob.).

Cigogne noire: passage au-dessus de la moyenne, SOPM=50 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=29 ind.). A noter un estivage de 2 ad. dans le canton de Lucerne (observations entre le 12.4. et le 19.7.), mais sans indice de nidification (div. obs.).

Sichler: 31.3. 1 Ind. Rheindelta A (W.Leuthold). Unter Vorbehalt der Anerkennung.

Löffler: Viele Meldungen: 22.3., 27.4., 17./25.5., 27./29.6. 1 Ind., 18.5. 2 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin (S.Aubry u.a.). Aufenthalt eines Ind. vom 16.6. bis 19.7. am Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann u.a.), dann 1 Ind. 21./23.-24.7. Yverdon VD (B.Piot u.a.), 16.4. 1 Ind. Lachen SZ (L.Hüppin), 17.4., 7.6. 1 Ind. Rheindelta A (P.Knaus, W.Leuthold), 16.-17.5. 1 Ind. Préverenges VD (M.Dvorak, O.Jean-Petit-Matile, E.Morard, L.Maumary, F.Jaquier), 20.5. 1 Ind. Radelfingen BE (A.Meyer), 28.6. 1 Ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (P.Roth).

Saatgans: U.a. durchgehende Anwesenheit eines Ind. von Mitte Dezember bis 23.4. Lac de Divonne F (B.Piot, A.Barbalat, C.Schönbächler).

Graugans: Folgende Brutnachweise liegen vor: mind. 2 Fam. Flachsee Unterlunkhofen AG (E.Weiss, W. Burri, P.Roth u.a.), mind. 5 Gelege und dann 2 Fam. Zellmoos LU (R.Wüst-Graf, H.Schmid, B.Volet), 2 Fam. Mauensee LU (R.Wüst-Graf, R.Hardegger, H.Schmid), 2 Fam. Zug ZG (D.Kronauer), 2 Gelege und mind. 1 Fam. Fanel BE (P. Rapin u.a.), 1 brütendes Ind. Conthey VS am 8.5. (B.Posse).

Rostgans: Folgende Brutnachweise liegen vor: mind. 3 Fam. Flachsee Unterlunkhofen AG (P.Roth, E.Weiss u.a.), 3 Fam. Klingnauer Stausee AG (G.Oesterhelt, E.Weiss, F.Kurz, W.Oberhänsli u.a.), 1 Fam. Künsnacht ZH (Herr Glätti), 1 Fam. Männedorf ZH (M.Widmer), 1 Fam. Rapperswil SG (K.Anderegg), mind. 3 Fam. Greifensee ZH (P.J.Brändli, H.Klopfenstein, E.Grether u.a.), 3 Fam. Chatzensee ZH (S.Muff, P.Walser, H.Klopfenstein), 1 Fam. Leutwil AG, 1 Fam. Boniswil AG (beide R.Berner), 1 Fam. Muri AG (D.Thiel), mind. 2 Fam. Augst-Wyhlen BL (G.Oesterhelt, R.Freuler, M.Schweizer), 1 Fam. Rheinfeldern AG (R.Freuler), 1 Fam. Stein am Rhein SH (H.Wächter), je 1 Gelege Etziken SO und 1 Ermensee LU, beide in Schleiereulenkasten (H.-P.Aeschlimann, N.Troxler).

Nilgans: U.a. eine erfolgreiche Brut am Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann, P.Höhener, E.Weiss, A.Sutter, G.Oesterhelt), im zweiten aufeinander folgenden Jahr.

Brandgans: Viele Sommerbeobachtungen: u.a. 23.-26.6. 22 Ind. Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann, D.Hagist, A.Sutter u.a.). Ausserhalb des Mittellandes: 21.3. 2 Ind. Stausee Biaufond JU (M. Farine), 7.4. 3 Ind. Boécourt JU (J.-M. Gisiger), 24.4. 2 Ind. Lauerzersee SZ (P.Kühne), 13.5. 1 Ind. Versvey/ Yvorne VD (N.Jordan, J.-C.Tièche).

Schnatterente: Es wurde nur eine Beobachtung einer Familie gemeldet: 15.6. 1 mit 9 pulli Klingnauer Stausee AG (G.Oesterhelt).

Knäkente: Unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=1332 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=1901 Ind.). U.a. 27.3. 64 Ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle).

Ibis falcinelle: 31.3. 1 ind. Rheindelta A (W.Leuthold). Sous réserve d'homologation.

Spatule blanche: beaucoup de données: au Fanel BE/Chablais de Cudrefin, le 22.3. déjà 1 ind. (S.Aubry), puis 27.4., 17./25.5., 27./29.6. 1 ind., 18.5. 2 ind. (div. obs.). Séjour d'un ind. au Klingnauer Stausee AG du 16.6. au 19.7. (J.Hartmann et al.), puis 1 ind. les 21./23.-24.7. à Yverdon VD (B.Piot et al.). Ailleurs, 16.4. 1 ind. Lachen SZ (L.Hüppin), 17.4. et 7.6. 1 ind. Rheindelta A (P.Knaus, W.Leuthold), 16.-17.5 1 ind. Préverenges VD (M.Dvorak, O.Jean-Petit-Matile, E.Morard, L.Maumary, F.Jaquier), 20.5. 1 ind. Radelfingen BE (A.Meyer), 28.6. 1 ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (P.Roth).

Oie des moissons: à noter le séjour d'un ind. au lac de Divonne F, depuis mi-décembre 2003 jusqu'au 23.4. (B.Piot, A.Barbalat, C.Schönbächler).

Oie cendrée: preuves de reproduction: min. 2 fam. Flachsee Unterlunkhofen AG (E.Weiss, W. Burri, P.Roth et al.), min. 5 pontes et 2 fam. Zellmoos LU (R.Wüst-Graf, H.Schmid, B.Volet), 2 fam. Mauensee LU (R.Wüst-Graf, R.Hardegger, H.Schmid), 2 fam. Zug ZG (D.Kronauer), 2 pontes et min. 1 fam. au Fanel BE (P. Rapin et al.), 1 ind. couve à Conthey VS le 8.5. (B.Posse).


Tadorne casarca: nidifications: min. 3 fam. Flachsee Unterlunkhofen AG (P.Roth, E.Weiss et al.), 3 fam. Klingnauer Stausee AG (G.Oesterhelt, E.Weiss, F.Kurz, W.Oberhänsli et al.), 1 fam. Künsnacht ZH (Monsieur Glätti), 1 fam. Männedorf ZH (M.Widmer), 1 fam. Rapperswil SG (K.Anderegg), min. 3 fam. Greifensee ZH (P.J.Brändli, H.Klopfenstein, E.Grether et al.), 3 fam. Chatzensee ZH (S.Muff, P.Walser, H.Klopfenstein), 1 fam. Leutwil AG, 1 fam. Boniswil AG (les deux R.Berner), 1 fam. Muri AG (D.Thiel), min. 2 fam. Augst-Wyhlen BL (G.Oesterhelt, R.Freuler, M.Schweizer), 1 fam. Rheinfeldern AG (R.Freuler), 1 fam. Stein am Rhein SH (H.Wächter), 1 nid Etziken SO et 1 à Ermensee LU, les deux dans un nichoir à Effraie (H.-P.Aeschlimann, N.Troxler)

Ouette d'Egypte: à noter, reproduction réussie au Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann, P.Höhener, E.Weiss, A.Sutter, G.Oesterhelt), pour la 2^e année consécutive.

Tadorne de Belon: beaucoup de données estivales: max. 23.-26.6. 22 ind. Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann, D.Hagist, A.Sutter et al.). Hors du Plateau: 21.3. 2 ind. Retenue de Biaufond JU (M. Farine), 7.4. 3 ind. Boécourt JU (J.-M. Gisiger), 24.4. 2 ind. Lauerzersee SZ (P.Kühne), 13.5. 1 ind. Versvey/ Yvorne VD (N.Jordan, J.-C.Tièche).

Canard chipeau: une seule famille signalée: 15.6. 1 et 9 pulli Klingnauer Stausee AG (G.Oesterhelt).

Sarcelle d'été: passage en dessous de la moyenne, SOPM=1332 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=1901 ind.); à noter 27.3. 64 ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle).



Knäkente: Entwicklung der SOPM.

Sarcelle d'été: évolution des SOPM.

Kolbenente: Folgende Brutnachweise liegen vor: 1 Fam. Rolle VD (B.Genton), 1 Fam. Lausanne VD (P.Höhener), 1 brütend Préverenges VD (L.Maumary), 3 pulli in einer Reiherentenfamilie Montreux VD (Y.Eray), 3 Fam. Grandson VD (E.Sermet), 2 Gelege Chéseaux-Noréaz VD (M.Spiess), 1 Fam. Chevroux VD (P.Rapin), 2 pulli in einer Stockentenfamilie Cudrefin VD (P.Rapin), mind. 1 Fam., mind. 3 Gelege und 5 Mischgelege mit Stockenten Fanel BE (P.Rapin), mind. 6 Fam. Thun/Gwatt BE (M.Wettstein, R.Hauri, D.Lawnizak), 1 Fam. Hilterfingen BE (M.Wettstein), 2 pulli in einer Stockentenfamilie Klingauer Stausee AG (E.Weiss), 4 Fam. und Junge in 9 Stockentenfamilien Rapperswil/Jona SG (K.Anderegg, E.Grether), 1 Fam. und 3 pulli in einer Stockentenfamilie Wichelsee OW (S.Trinkler), 8 Fam. Luzern LU (A.Borgula), 2 Fam. Reussdelta UR (B.Imhof, B.Volet, M.Burkhardt), 1 Fam. Glattfelden ZH (R.Sand).

Tafelente: 1 Fam. Seedamm Rapperswil SG (K.Anderegg), 1 Fam. Glattfelden ZH (T.Stahel), 1 Fam. Lenzerheide GR 1490 m (C.Meier-Zwicky).

Reiherente: Folgende Brutnachweise liegen vor: Rolle VD 1 (B.Genton), Cully VD 1, Chardonne VD 1, La Tour-de-Peilz VD 1, Montreux VD 6 (alle Y.Eray), Les Grangettes VD 1, Versvey/Yvorne VD 2 (J.-C.Tièche), Lac de Bretaye VD 4 (E.Sermet, J.-C.Tièche), Lac des Chavonnes VD 1 (E.Sermet), Marais de Grône VS 9 (J.Rey, R.Hauri, P.Mosimann-Kampe), Saint-Louis F 5 (M.Spiess), Forellensee/Zweisimmen BE 2, Lenkersee BE 19 (R.Hauri), Weissenau BE 2 (P.Blaser, R.Hauri, M.Wettstein), Gunten BE 1 (P.Blaser), Gwatt BE 1 (M.Wettstein), Gerlafingerweiher BE 1 (K.Eigenheer, R.Hauri), Münchenstein BL 2 (B.Pfarr Gambke), Kaiseraugst AG 3 (R.Lüthi, G.Oesterhelt, R.Freuler), Klingnauer Stausee AG mind. 6 (div. Beob.), Flachsee Unterlunkhofen AG 1 (P.Roth), Rapperswil SG/Jona SG 1 (K.Anderegg), Luzern LU 1 (C.Schmidt, A.Borgula), Küssnacht am Rigi SZ 1 (G.Bachmann), Reussdelta mind. 7 (und 4 pulli in einer Stockentenfamilie) (B.Imhof, E.&B.Arnold Heim, M.Burkhardt u.a.), Unterschlatt TG 2 (M.Roost), Aegelsee TG 1 (H.Leuzinger), Nuolener Ried SZ 1 mit einem Kolbenententjungen (E.Grether),

Nette rousse: preuves de reproduction: 1 fam. Rolle VD (B.Genton), 1 fam. Lausanne VD (P.Höhener), 1 couve à Préverenges VD (L.Maumary), 3 pulli dans une famille de Morillons à Montreux VD (Y.Eray), 3 fam. Grandson VD (E.Sermet), 2 pontes à Chéseaux-Noréaz VD (M.Spiess), 1 fam. Chevroux VD (P.Rapin), 2 pulli dans une fam. de Colverts Cudrefin VD (P.Rapin), min. 1 fam., min. 3 pontes et 5 pontes mixtes avec Colverts au Fanel BE (P.Rapin), min. 6 fam. Thun/Gwatt BE (M.Wettstein, R.Hauri, D.Lawnizak), 1 fam. Hilterfingen BE (M.Wettstein), 2 pulli dans une fam. de Colverts au Klingauer Stausee AG (E.Weiss), 4 fam. et des juv. dans des fam. de colverts Rapperswil/Jona SG (K.Anderegg, E.Grether), 1 fam. et 3 pulli dans une fam. de Colverts au Wichelsee OW (S.Trinkler), 8 fam. Luzern LU (A.Borgula), 2 fam. Reussdelta UR (B.Imhof, B.Volet, M.Burkhardt), 1 fam. Glattfelden ZH (R.Sand).

Fuligule milouin: 1 fam. Seedamm Rapperswil SG (K.Anderegg), 1 fam. Glattfelden ZH (T.Stahel), 1 fam. Lenzerheide GR 1490 m (C.Meier-Zwicky).

Fuligule morillon: familles signalées: Rolle VD 1 (B.Genton), Cully VD 1, Chardonne VD 1, La Tour-de-Peilz VD 1, Montreux VD 6 (tous Y.Eray), Les Grangettes VD 1, Versvey/Yvorne VD 2 (J.-C.Tièche), Lac de Bretaye VD 4 (E.Sermet, J.-C.Tièche), Lac des Chavonnes VD 1 (E.Sermet), Marais de Grône VS 9 (J.Rey, R.Hauri, P.Mosimann-Kampe), Saint-Louis F 5 (M.Spiess), Forellensee/Zweisimmen BE 2, Lenkersee BE 19 (R.Hauri), Weissenau BE 2 (P.Blaser, R.Hauri, M.Wettstein), Gunten BE 1 (P.Blaser), Gwatt BE 1 (M.Wettstein), Gerlafingerweiher BE 1 (K.Eigenheer, R.Hauri), Münchenstein BL 2 (B.Pfarr Gambke), Kaiseraugst AG 3 (R.Lüthi, G.Oesterhelt, R.Freuler), Klingnauer Stausee AG min. 6 (div. obs.), Flachsee Unterlunkhofen AG 1 (P.Roth), Rapperswil SG/Jona SG 1 (K.Anderegg), Luzern LU 1 (C.Schmidt, A.Borgula), Küssnacht am Rigi SZ 1 (G.Bachmann), Reussdelta min. 7 (et 4 pulli dans une fam. de Colverts) (B.Imhof, E.&B.Arnold Heim, M.Burkhardt et al.), Unterschlatt TG 2 (M.Roost), Aegelsee TG 1 (H.Leuzinger), Nuolener Ried SZ 1 avec un pullus de Nette (E.Grether, K.&L.Felix), Kaltbrunner Riet

K.&L.Felix), Kaltbrunner Riet SG 1 (L.Hüppin), Bolle di Magadino TI 2 (A.Capol, C.Meier-Zwicky), Lenzerheide GR 1 (C.Meier-Zwicky), Stampa GR 2 (E.Mühlethaler), Samedan GR 3 (M.&F.Suter).

Bergente: Nebst Beobachtungen von Genfer-, Neuenburger- und Bodensee: 27.3. 1 Ind. Peney GE (A.Barbalat), 3./9./12./15.4 1 Ind. Greifensee ZH (P.J.Brändli, H.-U.Dössegger, W.Leuthold), 19.4. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (S.Keller).

Eisente: 17./20./22.3., 1.4. 2 Ind. Genève GE (div. Beob.).

Trauerente: 16./17.3., 1.5. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (H.Brüngger, J.Laesser, S.Theythaz, S.Keller), 29.3. 1 Ind. Marin-Epagnier NE (S.Keller), 28./30.4., 2./5./6./8.5. 2 Ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon, M.Burkhardt u.a.), 17.4. 1 Ind. Rheindelta A (P.Knaus).

Samtente: Sommeranwesenheit eines Männchens mind. bis 4.8. Fanel BE (div. Beob.).

Wespenbussard: Erste am 16.4. Grandval BE (E.Gunzinger). Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=1683 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁵⁻²⁰⁰³=1055 Ind.). Max.: 478 Ind. 11.5. Thollon F (collectif Hucel) und 442 Ind. am gleichen Tag Mont Pèlerin VD (groupe Mont Pèlerin). Während der Brutzeit u.a. 18.7. 1 Ind. Orsières VS 2090 m (M.Gerber).

Bartgeier: 17.3., 12.4., 28.5., 5./21.6. 1 Ind., 24./26.4. 2 Ind. Conthey VS (H.Brüngger, J.-C.Tièche, B.Posse, E.Bernardi u.a.), 23.3. 1 Ind. Sool GL (W.Kessler), 29.3. 1 Ind. Thollon F (collectif Hucel), 25.4. 1 Ind. Le Reposoir F (A.Barbalat), 27.4., 9.6. 1 Ind. Leukerbad VS (M.Burkhardt, K.Rösti), 28.5. 1 Ind. Dorénaz VS (B.Posse), 28.5. 1 Ind. Zernez GR (M.Hofer), 14.7. 1 Ind. Flims GR (P.Kunz), 16.7. 1 Ind. La Punt-Chamusch GR (F.Caduff), 23.7. 1 Ind. Pontresina GR (M.Suter, J.Denkinger).

Schlangenadler: 5.4. 1 Ind. Fully VS (P.-A.Ravussin), 23.4., 2./20.5 1 Ind. Thollon F (collectif Hucel), 9.6. 1 Ind. Leukerbad VS (K.Rösti), 25.7. 1 Ind. Evionnaz VS (N.Jordan). Bei Fort l'Ecluse F 1 Ind. 28.3., danach 2 Ind. anwesend (P.Charvoz, B.Piot).

Rohrweihe: Unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=439 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=633 Ind.). Juni- und Julibeobachtungen: 3.6. 1 Ind. Font FR (E.Morard), 3./12./20./22.6. und 1./3.7. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (M.Thoma, P.Frara, C'A.Balzari, P.Rapin u.a.), 6./15.6. 1 Ind. Chevroux VD (E.Morard), 9.6. 1 Ind. Neeracherried ZH (div. Beob.), 17.6. 1 Ind. Oerlinger Ried ZH (S.Gysel), 20.6. 1 Ind. Häusermoos BE (E.Reist), 22.6. und 27.7. 1 Ind. St-Louis F (B.Mächler, M.Spiess), 25.6. 1 Ind. Cheseaux-Noréaz VD (E.Morard), 2./3./8.7. 1 Ind. Chavornay VD (E.Morard, J.-M.Duflon, F.Jaquier u.a.), 18.7. 1 Ind. Forel FR (P.Rapin), 24.7. 1 Ind. Yverdon VD (F.Jaquier).

SG 1 (L.Hüppin), Bolle di Magadino TI 2 (A.Capol, C.Meier-Zwicky), Lenzerheide GR 1 (C.Meier-Zwicky), Stampa GR 2 (E.Mühlethaler), Samedan GR 3 (M.&F.Suter).

Fuligule milouinan: hors des Lacs Léman, de Neuchâtel et de Constance: 27.3. 1 ind. Peney GE (A.Barbalat), 3./9./12./15.4 1 ind. Greifensee ZH (P.J.Brändli, H.-U.Dössegger, W.Leuthold), 19.4. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (S.Keller).

Harelda boréale: 17./20./22.3. et 1.4. 2 ind. Genève GE (div. obs.).

Macreuse noire: 16./17.3 et 1.5. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (H.Brüngger, J.Laesser, S.Theythaz, S.Keller), 29.3. 1 ind. Marin-Epagnier NE (S.Keller), 28./30.4. et 2./5./6./8.5. 2 ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon, M.Burkhardt et al.), 17.4. 1 ind. Rheindelta A (P.Knaus).

Macreuse brune: présence estivale d'un mâle au Fanel BE, au moins jusqu'au 4.8. (div. obs.).

Bondrée apivore: première le 16.4. Grandval BE (E.Gunzinger). Présence en dessus de la moyenne: SOPM=1683 ind., moyenne¹⁹⁹⁵⁻²⁰⁰³=1055 ind. Max. de 478 ind. le 11.5. Thollon F (collectif Hucel) et de 442 le même jour au Mont Pèlerin VD (groupe Mont Pèlerin). En période de reproduction, à noter 18.7. 1 ind. Orsières VS 2090 m. (M.Gerber).

Gypaète barbu: 17.3., 12.4., 28.5., 5./21.6. 1 ind., 24./26.4. 2 ind. Conthey VS (H.Brüngger, J.-C.Tièche, B.Posse, E.Bernardi et al.), 23.3. 1 ind. Sool GL (W.Kessler), 29.3. 1 ind. Thollon F (collectif Hucel), 25.4. 1 ind. Le Reposoir F (A.Barbalat), 27.4., 9.6. 1 ind. Leukerbad VS (M.Burkhardt, K.Rösti), 28.5. 1 ind. Dorénaz VS (B.Posse) et 1 ind. Zernez GR (M.Hofer), 14.7. 1 ind. Flims GR (P.Kunz), 16.7. 1 ind. La Punt-Chamusch GR (F.Caduff), 23.7. 1 ind. Pontresina GR (M.Suter, J.Denkinger).

Circaète Jean-le-Blanc: 5.4. 1 ind. Fully VS (P.-A.Ravussin), 23.4., 2./20.5 1 ind. Thollon F (collectif Hucel), 9.6. 1 ind. Leukerbad VS (K.Rösti), 25.7. 1 ind. Evionnaz VS (N.Jordan). A Fort l'Ecluse F, premier le 28.3. puis 2 ind. présents (P.Charvoz, B.Piot).

Busard des roseaux: présence nettement plus faible que la moyenne: SOPM=439, moyenne¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=633 ind. Observations de juin et juillet: 3.6. 1 ind. Font FR (E.Morard), 3./12./20./22.6. et 1./3.7. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (M.Thoma, P.Frara, C'A.Balzari, P.Rapin et al.), 6./15.6. 1 ind. Chevroux VD (E.Morard), 9.6. 1 ind. Neeracherried ZH (div. obs.), 17.6. 1 ind. Oerlinger Ried ZH (S.Gysel), 20.6. 1 ind. Häusermoos BE (E.Reist), 22.6. et 27.7. 1 ind. St-Louis F (B.Mächler, M.Spiess), 25.6. 1 ind. Cheseaux-Noréaz VD (E.Morard), 2./3./8.7. 1 ind. Chavornay VD (E.Morard, J.-M.Duflon, F.Jaquier et al.), 18.7. 1 ind. Forel FR (P.Rapin), 24.7. 1 ind. Yverdon VD (F.Jaquier).

Kornweihe: Eine Sommerbeobachtung: 22.6. 1 Ind. Saint-Louis F (B.Mächler).

Wiesenweihe: Unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=31 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=58 Ind.). Erste am 31.3. Thollon F (collectif Hucel), danach 9.4. Cadenazzo TI (P.Stephani, E.Bolle), letzte am 17.5. Fort-l'Ecluse F (P.Charvoz).

Steinadler: 2 Meldungen aus dem Nordjura: 17.3. 2 Ind. Grandval BE (S.Gerber), 7.6. 1 Ind. 2 KJ Chaseral BE (S.Aubry).


Fischadler: Leicht überdurchschnittlicher Durchzug bis 30.5. (1 Ind. Chevroux VD, M.Antoniazza). SOPM=99 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=89 Ind.)

Busard Saint-Martin: une mention estivale: 22.6. 1 ind. Saint-Louis F (B.Mächler).

Busard cendré: faible passage, SOPM=31 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=58 ind.). Premier le 31.3. Thollon F (collectif Hucel), puis le 9.4. Cadenazzo TI (P.Stephani, E.Bolle), et dernier le 17.5. Fort-l'Ecluse F (P.Charvoz).

Aigle royal: 2 données dans le nord du Jura: 17.3. 2 ind. Grandval BE (S.Gerber), 7.6. 1 ind. 2 a.c. Chaseral BE (S.Aubry).

Balbuzard pêcheur: passage un peu au-dessus de la moyenne, se terminant le 30.5. (Chevroux VD, 1 ind., M.Antoniazza). SOPM=99 ind., moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=89 ind.



Fischadler: Beobachtungsorte (März bis Juni). Maximalzahl pro Kilometerquadrat.

Balbuzard pêcheur: sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique.

Rotfussfalke: Stark unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=60 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=191 Ind.). Max. 12.5. 6 Ind. Niederriedstausee BE (A.Niffeler).

Merlin: Einige späte Beobachtungen: 10.5. 1 Ind. Fort l'Ecluse F (P.Charvoz), 12.5. 1 Ind. Neunkirch SH (W.Geiger).

Baumfalke: Frühe Erstbeobachtung am 3.4., Marin-Epagnier NE (F.Turrian). U.a. 18.7. 1 Ind. Hasliberg BE 1900 m (B.Piot).

Tüpfelsumpfhuhn: Unterdurchschnittlicher Frühjahrszug mit 8 Meldungen von Einzelvögeln von 8 Orten. Daneben 1./11./14./15./29.5 1-3 Ind. auch singend Neeracherried ZH (W.Müller, S.Heller, C.Baumberger). Herbstzug: Beginn am 11.7. Martigny VS mit einem Totfund eines Ind. 1 KJ (B.Posse), dann regelmässig ab dem 17.7. (div. Beob.).

Kleines Sumpfhuhn: 11.-13.4. 1 Ind. Uster ZH (S.Kohl, H.-U. Dössegger, E.Grether), 20.4. 1 Ind.

Faucon kobez: faible passage, SOPM=60 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=191 ind.). Max. 12.5. 6 ind. Niederriedstausee BE (A.Niffeler).

Faucon émerillon: quelques ind. tardifs: 10.5. 1 ind. Fort l'Ecluse F (P.Charvoz), 12.5. 1 ind. Neunkirch SH (W.Geiger).

Faucon hobereau: Premier, hâtif, le 3.4., Marin-Epagnier NE (F.Turrian). A noter: 18.7. 1 ind. Hasliberg BE 1900 m (B.Piot).

Marouette ponctuée: passage pré-nuptial en dessous de la moyenne: 8 données d'isolés de 8 localités (div. obs.). De plus, 1./11./14./15./29.5 1-3 ind. dont ch. Neeracherried ZH (W.Müller, S.Heller, C.Baumberger). Passage post-nuptial: débute le 11.7. à Martigny VS avec 1 ind. 1 a.c. trouvé mort (B.Posse), puis données régulières dès le 17.7. (div. obs.).

Marouette poussin: 11.-13.4. 1 ind. Uster ZH (S.Kohl, H.-U. Dössegger, E.Grether), 20.4. 1 ind.

Fanel BE (D.Arrigo), 8./12.5, 1./6.6.1 Ind., 9.5. 2 Ind. Kaltbrunner Riet SG (H.Geisser, A.Täschler, M.Spiess), 10.-12.8. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (G.Fischer, E.Weiss, S.Stutz).

Wachtelkönig: In diesem Jahr weniger verbreitet, doch immer noch häufiger als 2001 (S.Stucki); Beobachtungen aus 28 Kilometerquadraten ab dem 30.4. (2 Ind. Klettgau SH, M.Jenny).

Kranich: Leicht überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=76 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=68 Ind.). Letzte Beobachtung: 25.5. 1 Ind. Magadino TI (P.Ricceri).

Austernfischer: Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=43 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=28 Ind.). 29.3. 1 Ind., 1-10.5. 3 Ind., 24./25.5. 1 Ind. Les Grangettes VD (J.M. Fivat, A.Barbalat, Y.Eray, L.Maumary u.a.), 8./12.4., 23./27.5. je 1 Ind., 8.6. 5 Ind. Préverenges VD (E.Bernardi, H.Duperrex, L.Maumary, E.Morard u.a.), 25.4. 1 Ind. Agno TI (M.Hotz), 27.4. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (D.Hagist), 27.4. 3 Ind. Seedamm bei Rapperswil SG (K.Anderegg, A.Täschler), 6.-10.5. 2 Ind. im Raum Schmerikon SG-Frauenwinkel SZ (E.Grether, A.Täschler, T.Vonwil), 20.5. 1 Ind. Gaissau A (C.Baumberger), 24.5. 1 Ind., 7.6. 4 Ind. Rheindelta A (W.Leuthold), 20./22.7. 1 Ind. Yverdon VD (E.Morard, C.&M.Henderson), 13.8. 1 Ind. Luzern (A.Borgula).

Stelzenläufer: U.a. 26.4. 3 Ind. Préverenges VD (L.Maumary, J.-M.Duflon), 27.4. 4 Ind. Cartigny GE (P.Blaser, J.Guibert, M.Rogg), 28.4. 3 Ind. Uster ZH (E.Grether, S.Kohl), 3.5. 4 Ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (D.Hagist, A.Huber, A.Ingold).

Säbelschnäbler: Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=41 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=35 Ind.). U.a. 15.4. 18 Ind. Chablais de Cudrefin VD (P.Rapin, P.Tröndle).

Triel: 3.4. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (P.Kühne, D.Marques, A.Täschler), 8.4. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (D.Kratzer), 14.4. 1 Ind. Ottenbach ZH (K.&L.Felix), 21.4. 1 Ind. Genolier VD (L.Maumary), 10.5. 1 Ind. Selzach SO (W.Christen), 3.7. 1 Ind. Bätterkinden BE (S.Bachmann).

Seeregenpfeifer: 1.-8.4. 1 Ind. Préverenges VD (H.Duperrex, G.Medina, L.Maumary u.a.), 4.-5.4., 18.-19.7. je 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (M.Dvorak, D.Hagist u.a.), 15./18./19.4. 1 Ind. Les Grangettes VD (Y.Eray, N.Jordan, E.Sermet).

Goldregenpfeifer: Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=65 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=54 Ind.). 16.-18.3. 1 Ind. Neeracherried ZH (W.Leuthold, D.Marques), 17.3. 1 Ind. Rheindelta A (W.Greminger), 24.3., 1.4. 1 Ind. Chrümmi FR (C.Jaberg, H.Brügger), 1.4. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (H.Brügger, W.Schaub, T.Schwaller), 3.4. 2 Ind. Kallnach BE (H.Edelmann).

Fanel BE (D.Arrigo), 8./12.5, 1./6.6.1 ind., 9.5. 2 ind. Kaltbrunner Riet SG (H.Geisser, A.Täschler, M.Spiess). Passage post-nuptial: 10.-12.8. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (G.Fischer, E.Weiss, S.Stutz).

Rôle des genêts: moins abondant cette année, mais tout de même plus d'oiseaux qu'en 2001 (S.Stucki); noté dans 28 carrés kilométriques, dès le 30.4. (2 ind. dans le Klettgau SH, M.Jenny).

Grue cendrée: passage un peu au-dessus de la moyenne. Dernier ind. 25.5. Magadino TI (P.Ricceri). SOPM=76 ind., moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=68 ind.

Huitrier pie: fort passage, SOPM=43 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=28 ind.). 29.3. 1 ind., 1-10.5. 3 ind., 24./25.5. 1 ind. Les Grangettes VD (J.M. Fivat, A.Barbalat, Y.Eray, L.Maumary et al.), 8./12.4. et 23./27.5. 1 ind., 8.6. 5 ind. Préverenges VD (E.Bernardi, H.Duperrex, L.Maumary, E.Morard et al.), 25.4. 1 ind. Agno TI (M.Hotz), 27.4. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (D.Hagist), 27.4. 3 ind. Rapperswil SG (K.Anderegg, A.Täschler), 6.-10.5. 2 ind. dans la région Schmerikon SG-Frauenwinkel SZ (E.Grether, A.Täschler, T.Vonwil), 20.5. 1 ind. Gaissau A (C.Baumberger), 24.5. 1 ind., 7.6. 4 ind. Rheindelta A (W.Leuthold), 20./22.7. 1 ind. Yverdon VD (E.Morard, C.&M.Henderson), 13.8. 1 ind. Luzern (A.Borgula).

Echasse blanche: à noter: 26.4. 3 ind. Préverenges VD (L.Maumary, J.-M.Duflon), 27.4. 4 ind. Cartigny GE (P.Blaser, J.Guibert, M.Rogg), 28.4. 3 ind. Uster ZH (E.Grether, S.Kohl), 3.5. 4 ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (D.Hagist, A.Huber, A.Ingold).

Avocette élégante: passage un peu au-dessus de la moyenne, SOPM=41 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=35 ind.). A noter: 15.4. 18 ind. Chablais de Cudrefin VD (P.Rapin, P.Tröndle).


Édicnème criard: 3.4. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (P.Kühne, D.Marques, A.Täschler), 8.4. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (D.Kratzer), 14.4. 1 ind. Ottenbach ZH (K.&L.Felix), 21.4. 1 ind. Genolier VD (L.Maumary), 10.5. 1 ind. Selzach SO (W.Christen), 3.7. 1 ind. Bätterkinden BE (S.Bachmann).

Gravelot à collier interrompu: 1.-8.4. 1 ind. Préverenges VD (H.Duperrex, G.Medina, L.Maumary et al.), 4.-5.4. et 18.-19.7. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (M.Dvorak, D.Hagist et al.), 15./18./19.4. 1 ind. Les Grangettes VD (Y.Eray, N.Jordan, E.Sermet).

Pluvier doré: bon passage, SOPM=65 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=54 ind.). 16.-18.3. 1 ind. Neeracherried ZH (W.Leuthold, D.Marques), 17.3. 1 ind. Rheindelta A (W.Greminger), 24.3., 1.4. 1 ind. Chrümmi FR (C.Jaberg, H.Brügger), 1.4. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (H.Brügger, W.Schaub, T.Schwaller), 3.4. 2 ind. Kallnach BE (H.Edelmann).

Kiebitzregenpfeifer: Unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=14 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=28 Ind.). 3.-12.5., 2./11.6. 1-2 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (S.Aubry, C.Sinz u.a.), 7.-9.5. 1 Ind. Préverenges VD (Y.Eray, G.Medina, L.Maumary, E.Morard), 8./10.5. 1 Ind. Zug (D.Kronauer), 9.5. 2 Ind. Neeracherried ZH (div. Beob.), 11.-13.5. 1 Ind. Sempach LU (B.Volet u.a.), 29.5. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (W.Portmann, A.Sutter, E.Weiss), 14.8. 1 Ind. Rohrspitz A (P.J.Brändli).

Pluvier argenté: faible passage, SOPM=14 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=28 ind.). 3.-12.5., 2./11.6. 1-2 ind Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (S.Aubry, C.Sinz et al.), 7.-9.5. 1 ind. Préverenges VD (Y.Eray, G.Medina, L.Maumary, E.Morard), 8./10.5. 1 ind. Zug (D.Kronauer), 9.5. 2 ind. Neeracherried ZH (div. obs.), 11.-13.5. 1 ind. Sempach LU (B.Volet et al.), 29.5. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (W.Portmann, A.Sutter, E.Weiss), 14.8. 1 ind. Rohrspitz A (P.J.Brändli).



Knutt: Entwicklung der SOPM.


Bécasseau maubèche: évolution des SOPM.

Knutt: Weit überdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Höchstwert bei der SOPM=285 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=44 Ind.). Starker Einflug Anfang Mai: U.a. 9.5. 50 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (R.Burri, D.Hagist, A.Meyer) neue Höchstzahl für die Schweiz, 9.5. 24 Ind. Thun BE (M.Wettstein), 9.5. 23 Ind. Oensingen SO (M.Mooser), 10.-13.5. 18 Ind. Préverenges VD (L.Maumary, E.Morard, N.Philo u.a.).

Bécasseau maubèche: très fort passage avec un nouveau record de SOPM=285 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=44 ind.). Arrivée massive début mai: 9.5. 50 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (R.Burri, D.Hagist, A.Meyer) nouveau record pour la Suisse, 9.5. 24 ind. Thun BE (M.Wettstein), 9.5. 23 ind. Oensingen SO (M.Mooser), 10.-13.5. 18 ind. Préverenges VD (L.Maumary, E.Morard, N.Philo et al.)

Sanderling: Überdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Höchstwert bei der SOPM=148 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=79 Ind.). Starker Einflug Anfang Mai: U.a. 7.5. 10 Ind. Fanel BE (M.Schaub), 9.5.

Bécasseau sanderling: fort passage avec un nouveau record de SOPM=148 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=79 ind.). Arrivée massive début mai: 7.5. 10 ind. Fanel BE (M.Schaub), 9.5. 24 ind. Allaman VD (E.Bernardi), 9.5. 20 ind. Préverenges VD (Y.Eray, L.Maumary,



Zwergstrandläufer: Entwicklung der SOPM.

Bécasseau minute: évolution des SOPM.

24 Ind. Allaman VD (E.Bernardi), 9.5. 20 Ind. Préverenges VD (Y.Eray, L.Maumary, E.Morard, B.Piot), 9.5. 2 Ind. Leuk VS (C.Sinz).

Zwergstrandläufer: Weit unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=37 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=106 Ind.).

Temminckstrandläufer: Überdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Höchstwert bei der SOPM=150 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=30 Ind.). U.a. 5.-6.5. 11 Ind. Fanel BE (F.Turrian, E.Morard).

Bekassine: U.a. 31.7. 1 Ind. Val Bedretto TI auf 2200 m (P.Ricceri).

Pfuhlschnepfe: Weit überdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Höchstwert bei der SOPM=139 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=13 Ind.). U.a. 6./9.5. 1 Ind. Leuk VS (C.Sinz), 9.-10.5. 1 Ind. Martigny VS (B.Posse, C.Keim), bis 20 Ind. Préverenges VD (9.5., L.Maumary).


E.Morard, B.Piot, 9.5. 2 ind. Leuk VS (C.Sinz).

Bécasseau minute: passage nettement en dessous de la moyenne avec une SOPM=37 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=106 ind.).

Bécasseau de Temminck: très fort passage avec un nouveau record de SOPM=150 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=30 ind.). A noter: 5.-6.5. 11 ind. Fanel BE (F.Turrian, E.Morard).


Bécassine des marais: à noter: 31.7. 1 ind. val Bedretto TI 2200 m (P.Ricceri).

Barge rousse: très fort passage avec un nouveau record de SOPM=139 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=13 ind.). A noter: 6./9.5. 1 ind. Leuk VS (C.Sinz), 9.-10.5. 1 ind. Martigny VS (B.Posse, C.Keim), jusqu'à 20 ind. Préverenges VD (9.5., L.Maumary).



Rotschenkel: Beobachtungsorte (März bis Juni). Maximalzahl pro Kilometerquadrat.

Chevalier gambette: sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique.



Rotschenkel: Entwicklung der SOPM.

Chevalier gambette: évolution des SOPM.

Rotschenkel: Weit überdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Höchstwert bei der SOPM=1948 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=368 Ind.). Starker Einflug Anfang Mai: U.a. 8.5. 63 Ind., 9.5. 114 Ind., 10.5. 100 Ind. Préverenges VD (E.Bernardi, Y.Eray, L.Maumary), 9.5. 100 Ind., 10.5. 112 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (U.Kägi, W.Schaub u.a.), 9.5. 41 Ind. Leuk VS (C.Sinz), 10.5. 84 Ind. Klingnauer Stausee AG (T.Stahel). An diversen Orten wurden noch bis Mitte Mai grössere Ansammlungen beobachtet.


Teichwasserläufer: 1.5. 1 Ind. Chrümmi FR (A.Bassin, A.Gerber, P.Lustenberger), einzige Frühjahrsbeobachtung!

Grünschenkel: U.a. 15.8. 1 Ind. Kerns OW auf 1980 m (M.Wettstein).

Chevalier gambette: très fort passage avec un nouveau record de SOPM=1948 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=368 ind.). Arrivée massive début mai: 8.5. 63 ind., 9.5. 114 ind., 10.5. 100 ind. Préverenges VD (E.Bernardi, Y.Eray, L.Maumary), 9.5. 100 ind., 10.5. 112 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (U.Kägi, W.Schaub et al.), 9.5. 41 ind. Leuk VS (C.Sinz), 10.5. 84 ind. Klingnauer Stausee AG (T.Stahel). Des groupes importants ont encore été observés jusqu'à mi-mai.

Chevalier stagnatile: 1.5. 1 ind. Chrümmi FR (A.Bassin, A.Gerber, P.Lustenberger), seule donnée printanière!

Chevalier aboyeur: à noter: 15.8. 1 ind. Kerns OW 1980 m (M.Wettstein).



Steinwalzer: Weit uberdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Hochstwert bei der SOPM=209 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=24 Ind.). Starker Einflug Anfang Mai: U.a. 5.5. 11 Ind. Sempach LU (B.Volet), 9.5. 23 Ind. Préverenges VD (Y.Eray, L.Maumary), 9.5. 30 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (R.Burri, A.Meyer), neue Hochstzahl fur die Schweiz, 9.5. 10 Ind. Rapperswil SG (H.Geisser).

Schwarzkopfmowe: Starker Fruhjahrszug. 4 Bruten, davon 3 erfolgreich Rapperswil SG (K.Anderegg u.a.).

Zwergmowe: 2.4. 1 Ind. Neeracherried ZH (W.Leuthold), 3.4. 1 Ind. Préverenges VD (M.Rogg, H.Duperrex), ab dem 15.4. regelmassiger. Uberdurchschnittlicher Durchzug mit einer SOPM=2019 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=1694 Ind.).

Heringsmowe: U.a. 20.3. 27 Ind. Coffrane NE (C.Sinz, A.Frei). Durchgehende Anwesenheit von 1-4 Ind. Fanel BE, im Mai und Juni mehrmals Brutverhalten (Balz, Kopulation, Verteidigungsverhalten)

Tourneperre a collier: tres fort passage avec un nouveau record de SOPM=209 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=24 ind.). Arrivée massive début mai: 5.5. 11 ind. Sempach LU (B.Volet), 9.5. 23 ind. Préverenges VD (Y.Eray, L.Maumary), 9.5. 30 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (R.Burri, A.Meyer) nouveau record pour la Suisse, 9.5. 10 ind. Rapperswil SG (H.Geisser).


Mouette mélanocéphale: forte présence printanière, SOPM=275 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=153 ind.). 4 nidifications a Rapperswil SG avec 3 nichées réussies (K.Anderegg et al.).

Mouette pygmée: 2.4. 1 ind. Neeracherried ZH (W.Leuthold) et 3.4. 1 ind. Préverenges VD (M.Rogg, H.Duperrex), puis régulièrement dès le 15.4. Passage en dessus de la moyenne, SOPM=2019 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=1694 ind.).

Goéland brun: a noter 20.3. 27 ind. Coffrane NE (C.Sinz, A.Frei). Présence continue de 1-4 ind. au Fanel BE, comportement nuptial (parade, copulation, alarme) observé a plusieurs reprises en mai

Steinwalzer: Beobachtungsorte (Marz bis Juni). Maximalzahl pro Kilometerquadrat.

Tourneperre a collier: sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique.



Schwarzkopfmöwe:
Beobachtungsorte
(März bis Juni). Maxi-
malzahl pro Kilometer-
quadrat.

Mouette mélanocéphale: sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique.

beobachtet (P.Rapin, H.-U.Dössegger u.a.), doch fehlt ein eigentlicher Brutnachweis.

Silbermöwe: 17.3. 1 Ind. Rheindelta A (W.Greminger), 10.4. 1 Ind. Marin-Epagnier NE (T.Stahel, S.Stutz).

Weisskopfmöwe: Eine erfolglose Brut Weissenau BE (R.Hauri), neuer Brutort. Zwei Beobachtungen der Unterart *L. c. cachinnans*: 15.3./2.4. 1 Ind. 2.KJ Préverenges VD (L.Maumary), 13.7. 2 Ind. Fanel BE (P.Mosimann-Kampe).

Dreizehenmöwe: 2./6.4. 1 Ind. Préverenges VD (J.-M.Duflon, H.Duperrex, L.Maumary, P.Höhener), 5./7.4. 1 Ind. Morges VD (E.Bernardi, E.Morard), 13.4. 1 Ind. Versoix GE (E.Bertouille).

Raubseeschwalbe: Durchschnittlicher Frühjahrszug: 27.4. 1 Ind. Rheindelta A (W.Christen), 1.5. 3 Ind. Fanel BE (S.Aubry), 5.5. 2 Ind., 7.5. 4 Ind., 10./17./23.5. und 2.-4.6. 1 Ind. Préverenges VD (div. Beob.), 6.5. 1 Ind., 7.5. 2 Ind. Freienbach ZH (K.Anderegg, E.Grether) 6.5. 1 Ind. Rapperswil SG (H.Klopfenstein), 10.5. 1 Ind. Wädenswil ZH (K.+L.Felix), 5.-6.6. 1 Ind. Neeracherried (div. Beob.), 5.6. 1 Ind. Zürich ZH (D.Hashmi), 6.6. 1 Ind. Arth SZ (H.Schuler). Einsetzender Herbstzug ab 29.7. (1 Ind. Sciez F, J.-P. Jordan).

Brandseeschwalbe: 22.4. 2 Ind., 21.7. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (A.Riedo, C.Jaberg), 23.4., 16.6. 1 Ind. Préverenges VD (L.Maumary, E.Morard), 5.8. 1 Ind. Gwatt BE (M.Wettstein).

Flusseeeschwalbe: 24.3. 1 Ind. Genf (C.Guex.) früh, 31.3. 1 Ind. Préverenges VD (L.Maumary, E.Morard), danach regelmässig. Neue Brutplätze: 1 BP Pfäffikersee ZH (W.Hunkeler u.a.) und 1 BP Bas-Vully FR (M.Beaud, C.Jaberg).

et juin mais pas de preuve de nidification (P.Rapin, H.-U.Dössegger et al.).

Goéland argenté: 17.3. 1 ind. Rheindelta A (W.Greminger), 10.4. 1 ind. Marin-Epagnier NE (T.Stahel, S.Stutz).

Goéland leucophaé: un couple niche sans succès à la Weissenau BE (R.Hauri), nouveau site. Deux observations de la sous-espèce *L. c. cachinnans*: 15.3./2.4. 1 ind. 2 a.c. Préverenges VD (L.Maumary), 13.7. 2 ind. Fanel BE (P.Mosimann-Kampe).

Mouette tridactyle: 2./6.4. 1 ind. Préverenges VD (J.-M.Duflon, H.Duperrex, L.Maumary, P.Höhener), 5./7.4. 1 ind. Morges VD (E.Bernardi, E.Morard), 13.4. 1 ind. Versoix GE (E.Bertouille).

Sterne caspienne: passage pré-nuptial dans la norme, SOPM=14 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=16 ind.): 27.4. 1 ind. Rheindelta A (W.Christen), 1.5. 3 ind. Fanel BE (S.Aubry), 5.5. 2 ind., 7.5. 4 ind., 10./17./23.5. et 2.-4.6. 1 ind. Préverenges VD (div. obs.), 6.5. 1 ind., 7.5. 2 ind. Rapperswil SG (K.Anderegg, E.Grether, H.Klopfenstein), 10.5. 1 ind. Wädenswil ZH (K.&L.Felix), 5.-6.6. 1 ind. Neeracherried (div. obs.), 5.6. 1 ind. Zürich ZH (D.Hashmi), 6.6. 1 ind. Arth SZ (H.Schuler). Début du passage post-nuptial: 29.7. 1 ind. Sciez F (J.-P. Jordan).

Sterne caugek: 22.4. 2 ind., 21.7. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (A.Riedo, C.Jaberg), 23.4., 16.6. 1 ind. Préverenges VD (L.Maumary, E.Morard), 5.8. 1 ind. Gwatt BE (M.Wettstein).

Sterne pierregarin: 24.3. 1 ind. hâtif Genève GE (C.Guex.), 31.3. 1 ind. Préverenges VD (L.Maumary, E.Morard), ensuite régulière. Nouveaux sites de nidification: 1 couple Pfäffikersee ZH (W.Hunkeler et al.) et 1 couple Bas-Vully FR (M.Beaud, C.Jaberg).

Zwergseeschwalbe: 24.4. 1 Ind. Neeracherried ZH (C.Baumberger), 12./25./30.5., 7.6. 1 Ind., 11.5. 2 Ind., 12.6. 3 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beob.), 18.5. 1 Ind., 9.6. 2 Ind. Préverenges VD (M.Gelin, P.Moulin, J.-P.Besse), 7.6. 1 Ind. Rheindelta A (W.Leuthold), 24.7. 1 Ind. Yverdon VD (A.Barbalat, F.Jaquier).

Weissbartseeschwalbe: Leicht unterdurchschnittlicher Durchzug, SOPM=141 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=175 Ind.). Ausserhalb des Mittellandes: 1.5. 1 Ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle), 21.5., 9.7. 1 Ind. Marais de Grône VS (E.Bernardi, J.Savioz). 23.7. 2 Ind. Wädenswil ZH (K.&L.Felix).

Trauerseeschwalbe: Überdurchschnittlicher Durchzug, SOPM=3484 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=2967 Ind.). Max. ca. 450 Ind., 2.5. Préverenges VD (Y.Eray). Ausserhalb des Mittellandes: 30.4. 1 Ind. Marais de Grône VS (J.Rey).

Weissflügelseeschwalbe: wenige Meldungen: 29.4. 4 Ind. Pfäffikersee ZH (S.Huber), 4./10.-11.5. 2 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (H.Klopfenstein, W.Schaub, M.Guggisberg), 11.5. 1 Ind. Rheindelta A (W.Leuthold).

Hohлтаube: U.a. 20.3. ca. 100 Ind. Birkenhofweiher BE (T.Stahel, S.Stutz), 11.4. 97 Ind. Aareebene BE/SO (K.Eigenheer).

Turteltaube: Schwaches Auftreten ab 23.4. mit einer SOPM=265 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=366 Ind.).

Schleiereule: U.a. 28.6. 1 Ind. Ronco TI auf 1490 m (M. Blattner), ungewöhnlicher Ort!

Sumpfohreule: 19.3. 1 Ind. Horgen, ZH (K.&L.Felix), 8.4. 1 Ind. Cudrefin VD (D.Arrigo), 13.4. 1 Ind. Saint-Sulpice VD (E.Morard), 9.5. 1 Ind. Fanel BE

Sterne naine: 24.4. 1 ind. Neeracherried ZH (C.Baumberger), 12./25./30.5., 7.6. 1 ind., 11.5. 2 ind., 12.6. 3 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. obs.), 18.5. 1 ind., 9.6. 2 ind. Préverenges VD (M.Gelin, P.Moulin, J.-P.Besse), 7.6. 1 ind. Rheindelta A (W.Leuthold), 24.7. 1 ind. Yverdon VD (A.Barbalat, F.Jaquier).

Guifette moustac: passage un peu en dessous de la moyenne, SOPM=141 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=175 ind.). Hors du plateau: 1.5. 1 ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle), 21.5., 9.7. 1 ind. Marais de Grône VS (E.Bernardi, J.Savioz). 23.7. 2 ind. Wädenswil ZH (K.&L.Felix).

Guifette noire: passage plus fort que la moyenne, SOPM=3484 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=2967 ind.). Max. d'env. 450 ind., 2.5. Préverenges VD (Y.Eray). Hors du Plateau: 30.4. 1 ind. Marais de Grône VS (J.Rey).

Guifette leucoptère: peu de données: 29.4. 4 ind. Pfäffikersee ZH (S.Huber), 4./10.-11.5. 2 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (H.Klopfenstein, W.Schaub, M.Guggisberg), 11.5. 1 ind. Rheindelta A (W.Leuthold).


Pigeon colombin: à noter 20.3. ca. 100 ind. Birkenhofweiher BE (T.Stahel, S.Stutz), 11.4. 97 ind. plaine de l'Aar BE/SO (K.Eigenheer).

Tourterelle des bois: faible présence notée dès le 23.4. SOPM₆=265 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=366 ind.).

Effraie des clochers: à noter 28.6. 1 ind. Ronco TI à 1490 m (M. Blattner), site inhabituel!

Hibou des marais: 19.3. 1 ind. Horgen, ZH (K.&L.Felix), 8.4. 1 ind. Cudrefin VD (D.Arrigo), 13.4. 1 ind. Saint-Sulpice VD (E.Morard), 9.5. 1 ind.

- 1-2
- 3-9
- 10-16



Bienenfresser: Beobachtungsorte (März bis Juni). Maximalzahl pro Kilometerquadrat.

Guépier d'Europe sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique.

(P.Lustenberger), 12.5. 1 Ind. Coffrane NE (C.Sinz, S.Morard).

Ziegenmelker: U.a. 26.4. 1 Sänger Reusstal AG (A.Huber), 23.5. 1 Ind. Bleniotal TI (R.Teuscher, C.Hedinger), ungewöhnliche Orte.

Mauersegler: Erstbeobachtung bereits im März, 26.3. 1 Ind. Payerne VD (A.Riedo), dann ab 2.4. erste Vögel an den Brutplätzen: 17.4. Zofingen AG (V.Specht, C.Vogel), 22.4. Payerne VD (P.Rapin). bereits am 18.4. ein Paar am Nest in Féchy VD (B.Genton).

Bienenfresser: Starker Durchzug mit Beobachtungen aus 38 Kilometerquadraten (siehe Karte), mit sehr frühen Beobachtungen: 6.-7.4. 1 Ind. Bolle di Magadino TI (B.Amez-Droz), frühestes Beobachtungsdatum in unserer Datenbank. Dann ab dem 19.4. SOPM=308 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=148 Ind.). In zwei Brutkolonien im Kanton Waadt total 14-15 Paare (div. Beob.). Daneben 2 Ind. in einer Zürcher Kiesgrube am 6.6., dort mindestens 8 Ind. am 7.8., davon 4 grosse Jungvögel, die noch gefüttert werden (R.Sand, W.Leuthold).

Wendehals: U.a. 10.6. 1 Sänger Valchava GR auf 2260 m (M.Hofer), 31.7. 1 Ind. Leukerbad VS auf 2290 m (M.Wettstein), sehr hoch!

Mittelspecht: U.a. 6.6. ein in einem Totempfehl brütendes Paar Allschwil BL (L.Meier-Freiburghaus).

Kurzzehenlerche: 12.4. 1 Ind., 16.4. 2 Ind., 25.4. 1 Ind. Nuolener Ried SZ (A.Weiss, L.Hüppin, E.Grether), 2./6.5. 1 Ind. Leuk VS (C.Sinz), 4.5. 1 Ind. St-Louis F (S.Keller), 7.5. 2 Ind. Cugnasco TI (M.Spiess), 8.5. 1 Ind. Merenschwand AG (P.Roth, H.v.Hirschheydt), 18.5. 1 Ind. Horgen ZH (K.&L.Felix).

Uferschwalbe: U.a. ein in einer Rebbergmauer brütendes Paar bei Féchy VD, im zweiten aufeinander folgenden Jahr (B.Genton).

Felsenschwalbe: U.a. 27.3. 400 Ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle), sehr grosse Ansammlung!

Brachpieper: Leicht überdurchschnittlicher Durchzug zwischen dem 3.4. und 18.5. mit Beobachtungen aus 40 Kilometerquadraten. Max. 5.5. 26 Ind., 6.5. 22 Ind. Raron VS (C.Sinz). Wie bereits 2002 ein Sänger im Juni oberhalb Zernez GR, auf 2450 m (R.Wüst).

Baumpieper: Weit überdurchschnittliches Auftreten ab 30.3. (1 Ind. Aareebene, BE/SO, W.Christen). Neuer Höchstwert bei der SOPM seit die Art in der Kategorie B eingeteilt ist: 1525 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁵⁻²⁰⁰³=840 Ind.).

Rotkehlpieper: Unterdurchschnittliches Auftreten zwischen dem 20.4. und 16.5. mit Beobachtungen aus 14 Kilometerquadraten. SOPM=22 Ind. (Mittel¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=35 Ind.). Max. 5.5. 3 Ind. Leuk VS (C.Sinz).

Fanel BE (P.Lustenberger), 12.5. 1 ind. Coffrane NE (C.Sinz, S.Morard).

Engoulevant d'Europe: à noter 26.4. 1 chanteur Reusstal AG (A.Huber), 23.5. 1 ind. val Blenio TI (R.Teuscher, C.Hedinger), deux sites inhabituels.

Martinet noir: une observation en mars déjà, 26.3. 1 ind. Payerne VD (A.Riedo), puis les suivantes dès le 2.4. Premières visites de cavité de nidification le 17.4. à Zofingen AG (V.Specht, C.Vogel), le 22.4. à Payerne VD (P.Rapin); le 18.4. un couple déjà au nid à Féchy VD (B.Genton).

Guêpier d'Europe: fort passage en 38 localités (voir carte), ayant débuté très tôt: 6.-7.4. 1 ind. Bolle di Magadino TI (B.Amez-Droz), date la plus précoce de notre banque de données, les suivants dès le 19.4. SOPM=308 ind. (moyenne¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=148 ind.). Deux colonies vaudoises totalisant 14-15 couples (div. obs.). Ailleurs, 2 ind. vus dans une gravière zurichoise le 6.6., puis au moins 8 ind. le 7.8., dont 4 grands juv. encore nourris par leurs parents (R.Sand, W.Leuthold).

Torcol fourmilier: à noter 10.6. 1 ch. Valchava GR à 2260 m (M.Hofer), 31.7. 1 ind. Leukerbad VS à 2290 m (M.Wettstein), très hauts!

Pic mar: à noter 6.6. un couple niche dans un totem à Allschwil BL (L.Meier-Freiburghaus).

Alouette calandrelle: 12.4. 1 ind., 16.4. 2 ind., 25.4. 1 ind. Nuolener Ried SZ (A.Weiss, L.Hüppin, E.Grether), 2./6.5. 1 ind. Leuk VS (C.Sinz), 4.5. 1 ind. St-Louis F (S.Keller), 7.5. 2 ind. Cugnasco TI (M.Spiess), 8.5. 1 ind. Merenschwand AG (P.Roth, H.v.Hirschheydt), 18.5. 1 ind. Horgen ZH (K.&L.Felix).


Hirondelle de rivage: à noter un couple nicheur dans un mur de vigne à Féchy VD, pour la deuxième année consécutive (B.Genton).

Hirondelle de rochers: à noter 27.3. 400 ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle), très grande troupe!

Pipit rousseline: passage un peu en dessus de la moyenne, du 3.4. au 18.5. en 40 carrés kilométriques. Max. 5.5. 26 ind., 6.5. 22 ind. Raron VS (C.Sinz). Comme en 2002, un chanteur cantonné en juin au dessus de Zernez GR, à 2450 m (R.Wüst).

Pipit des arbres: présence largement en dessus de la moyenne, à partir du 30.3. (1 ind. plaine de l'Aar, BE/SO, W.Christen). SOPM la plus élevée depuis que l'espèce est en catégorie B: 1525 ind. (moyenne¹⁹⁹⁵⁻²⁰⁰³=840 ind.).

Pipit à gorge rousse: faible passage du 20.4. au 16.5. en 14 carrés kilométriques. SOPM=22 ind. (moyenne¹⁹⁹⁴⁻²⁰⁰³=35 ind.). Max. 5.5. 3 ind. Leuk VS (C.Sinz).



Brachpieper: Beobachtungsorte (März bis Juni). Maximalzahl pro Kilometerquadrat.

Pipit rousseline: sites d'observation (mars-juin). Nombre max. d'individus par carré kilométrique

Schafstelze: Unterdurchschnittliches Auftreten ab dem 18.3. (1 Ind. Sionnet GE, M.Rogg, B.Posse). SOPM=268 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=327 Ind.).

Blauehlchen: Unterdurchschnittliches Auftreten bis 30.4. mit Beobachtungen aus 33 Kilometerquadraten. SOPM=35 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=51 Ind.). Aus dem Tessin wurden 4 Reviere der rotsternigen Unterart gemeldet, davon 3 sichere Bruten (A.Cereda, L.Jurietti u.a.), daneben 2 Bruten in den Berner Alpen (A.Niffeler, R.Kunz) und ein Sänger am 24.6. in Graubünden (A.Chappuis). 24.5.-3.7. ein Sänger der weissternigen Unterart im Rheintal SG (K.Moor, G.Sieber, W.Müller).

Blaumerle: Der Walliser Brutplatz war erneut besetzt (div. Beob.).

Seidensänger: 20.3.-28.5. 1-2 Ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle, N.Philo, P.Ricceri, A.Lubini, R.Hauri).

Feldschwirl: Starkes Auftreten ab dem 16.4. SOPM=410 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=251 Ind.).

Schilfrohrsänger: Unterdurchschnittliches Auftreten zwischen dem 30.3. und 20.5. mit Beobachtungen aus 33 Kilometerquadraten. SOPM=60 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=70 Ind.). Nach einer isolierten Meldung vom 3.7. am Klingnauer Stausee AG (E.Sauser) einsetzender Herbstzug ab 18.7.

Teichrohrsänger: Frühe Rückkehr: u.a. 3.4. Payerne VD (F.Schneider), 4.4 à Grône VS (M.Perraudin).

Drosselrohrsänger: Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=360 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=306 Ind.).

Bergeronnette printanière: présence modeste, notée dès le 18.3. (1 ind. Sionnet GE, M.Rogg, B.Posse). SOPM=268 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=327 ind.).

Gorgebleue à miroir: faible passage en 33 carrés kilométriques jusqu'au 30.4. SOPM=35 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=51 ind.). Quatre territoires de la race à miroir roux, dont 3 nidifications certaines, au Tessin (A.Cereda, L.Jurietti et al.), ainsi que deux nidifications dans les Alpes bernoises (A.Niffeler, R.Kunz) et un chanteur le 24.6. dans les Grisons (A.Chappuis). 24.5.-3.7. un chanteur de la race à miroir blanc dans la vallée du Rhin SG (K.Moor, G.Sieber, W.Müller).

Monticole bleu: nidification sur le site valaisan devenu traditionnel (div. obs.).

Bouscarle de Cetti: 20.3.-28.5. 1-2 ind. Bolle di Magadino TI (E.Bolle, N.Philo, P.Ricceri, A.Lubini, R.Hauri).

Locustelle tachetée: forte présence, notée à partir du 16.4., SOPM=410 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=251 ind.).

Phragmite des joncs: passage en dessous de la moyenne, du 30.3. au 20.5. en 33 carrés kilométriques. SOPM=60 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=70 ind.). Après un isolé le 3.7. au Klingnauer Stausee AG (E.Sauser), le passage postnuptial débute le 18.7.

Rousserolle effarvatte: arrivées précoces, dès le 3.4. à Payerne VD (F.Schneider) et le 4.4 à Grône VS (M.Perraudin).

Rousserolle turdoïde: présence en dessus de la moyenne, SOPM=360 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=306 ind.).

Orpheusspötter: Unterdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=75 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=88 Ind.). U.a. 9.6. ein Sänger Dötra TI auf 1840 m (B.Volet).

Sperbergrasmücke: 3 besetzte Reviere im Unterengadin GR (M.Alig, R.Wüst, H.Klopfenstein u.a.).

Klappergrasmücke: Überdurchschnittliches Auftreten ab dem 5.4. (Buchrain LU, F.Caduff). SOPM=422 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=354 Ind.).

Dorngrasmücke: Überdurchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen ab dem 4.4. (St.Moritz GR 1800 m, S.Signorell). SOPM=439 Ind. (Mittel₁₉₉₅₋₂₀₀₃=278 Ind.).

Gartengrasmücke: Zwei frühe Sänger: 3.4. Muttenz BL (M.Vezeli, P.Leu) und 4.4. Bottmingen BL (H.Hartmann).

Berglaubsänger: Weit überdurchschnittliches Auftreten mit einem neuen Höchstwert bei der SOPM der letzten 10 Jahre: 941 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=561 Ind.).

Zwergschnäpper: 20.5.-17.6. 1 Sänger Charmauvillers F (M.Farine, F.Klötzli), 50 m von der Schweizer Grenze entfernt.

Bartmeise: U.a. 31.3. 1 Ind. Neeracherried ZH (D.Marques).

Beutelmeise: Schwaches Auftreten bis Mai: 2.5. mind. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (U.Kägi, R.Freuler), 15.5. mind. 1 Ind. Leuk VS (U.Kägi). SOPM=240 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=389 Ind.).

Neuntöter: Überdurchschnittliches Auftreten mit einer SOPM=1220 Ind. (Mittel₁₉₉₄₋₂₀₀₃=927 Ind.); eine frühe Beobachtung am 15.4. Wauwilermoos LU (J.Linggi), dann einsetzender Durchzug ab dem 26.4.

Rotkopfwürger: Neben den Brutpaaren in der Nordwestschweiz: 29.4. 1 Ind. Hagimoos LU

Hypolais polyglotte: présence plutôt modeste, SOPM=75 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=88 ind.). A noter 9.6. un chanteur de passage à Dötra TI à 1840 m (B.Volet).

Fauvette épervière: 3 territoires occupés en Basse-Engadine GR (M.Alig, R.Wüst, H.Klopfenstein et al.).

Fauvette babillarde: présence un peu en dessus de la moyenne, notée dès le 5.4. (Buchrain LU, F.Caduff). SOPM=422 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=354 ind.).

Fauvette grisette: après une première mention le 4.4. à St.Moritz GR 1800 m (S.Signorell), l'espèce est présente en bon nombre. SOPM=439 ind. (moyenne₁₉₉₅₋₂₀₀₃=278 ind.).

Fauvette des jardins: deux chanteurs précoces bien observés le 3.4. à Muttenz BL (M.Vezeli, P.Leu) et le 4.4. à Bottmingen BL (H.Hartmann).

Pouillot de Bonelli: présence largement en dessus de la moyenne. SOPM la plus élevée de ces dix dernières années: 941 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=561 ind.).


Gobemouche nain: 20.5.-17.6. 1 chanteur Charmauvillers F (M.Farine, F.Klötzli), à 50 m de la frontière suisse.

Panure à moustaches: à noter 31.3. 1 ind. Neeracherried ZH (D.Marques).

Rémiz penduline: faible passage se terminant en mai: 2.5. min. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (U.Kägi, R.Freuler), 15.5. min. 1 ind. Leuk VS (U.Kägi). SOPM=240 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=389 ind.).

Pie-grièche écorcheur: présence en dessus de la moyenne, SOPM=1220 ind. (moyenne₁₉₉₄₋₂₀₀₃=927 ind.); un avant-coureur précoce le 15.4. au Wauwilermoos LU (J.Linggi), ailleurs dès le 26.4.

Pie-grièche à tête rousse: en dehors des quelques couples nicheurs du nord-ouest du pays: 29.4.



Erlenzeisig: Entwicklung der SOPM.

Tarin des aulnes: évolution des SOPM.

(R.Wüst), 1.5. 1 Ind. Stans NW (B.Bütler), 2.5. 1 Ind. Sionnet GE (Y.Schmidt, J.-E.Liberek), 8.5. 1 Ind. Domat/Ems GR (E.Lüscher-Riederer, G.Cramer), 14.5. 1 Ind. Crozet F (B.Piot), 27./29.6. 1 Ind. Ruswil LU (C.Furer, M.Hüsler), 6.7. 1 Ind. Niederwichttrach BE (S.Bachmann).

Erlenzeisig: Überdurchschnittliches Auftreten. SOPM=130 Ind. (siehe Abb.), aber immer noch deutlich tiefere Werte als im Invasionsjahr 1996, als die SOPM für diese Periode 1281 Ind. betrug.

Karmingimpel: 25.5. 1 Sänger Reckingen VS (U.Glutz), 25.5. 1 Sänger Geschinen VS (U.Glutz), 29.5. 1 Sänger Hospental UR (T.Weber), 31.5. 2 Ind. davon 1 ad. Le Chenit VD (E.Bernardi, O.Jean-Petit-Matile), 2.6. 1 imm. Nuolener Ried SZ (L.Hüppin), 3./7./8.6. 1 imm. Bedretto TI (L.Jurietti), 4./9.6. und 15./21.7. 1 ad. Obergesteln VS und Oberwald VS (A.Gerber, U.Glutz), 9.6. 1 Sänger Realp UR (K.Colombo), 11.6. 1 ad., 1 imm. und 1 weibchenfarbiges Ind. Göschenen UR (A.Borgula, H.Bolzern), 16.6. 1 ad. Lauenen BE (R.Hauri), 19.6. 1 imm. Ulrichen VS (S.Bächli), 30.6. 1 ad. All'Acqua TI (R.Kunz), 11.7. 1 ad. und 1 Tschamut GR (T.Stahel), 31.7. 1 ad. Kandersteg BE (M.Camici).

Goldammer: U.a. 16.7. 1 Sänger St-Martin VS auf 2190 m (B.Posse), sehr hoch!

Ortolan: Durchzug zwischen dem 7.4. und 15.5. mit Beobachtungen aus 69 Kilometerquadraten. Max. 29.4. 15 Ind. Ins BE (P.Mosimann-Kampe), 1.5. mind. 15 Ind. Turtmann VS (C.Sinz).

Graummer: Unterdurchschnittliches Auftreten wie auch schon in den letzten Jahren. SOPM=252 Ind. (Mittel₁₉₉₅₋₂₀₀₃=378 Ind.).

1 ind. Hagimoos LU (R.Wüst), 1.5. 1 ind. Stans NW (B.Bütler), 2.5. 1 ind. Sionnet GE (Y.Schmidt, J.-E.Liberek), 8.5. 1 ind. Domat/Ems GR (E.Lüscher-Riederer, G.Cramer), 14.5. 1 ind. Crozet F (B.Piot), 27./29.6. 1 ind. Ruswil LU (C.Furer, M.Hüsler), 6.7. 1 ind. Niederwichttrach BE (S.Bachmann).


Tarin des aulnes: présence plus marquée que ces dernières années. SOPM= 130 ind. (voir graphique) mais encore bien en dessous des valeurs de l'invasion de 1996, où la SOPM avait atteint 1281 ind.

Roselin cramoisi: 25.5. 1 chanteur Reckingen VS (U.Glutz), 25.5. 1 chanteur Geschinen VS (U.Glutz), 29.5. 1 chanteur Hospental UR (T.Weber), 31.5. 2 ind. dont 1 ad. Le Chenit VD (E.Bernardi, O.Jean-Petit-Matile), 2.6. 1 imm. Nuolener Ried SZ (L.Hüppin), 3./7./8.6. 1 imm. Bedretto TI (L.Jurietti), 4./9.6. et 15./21.7. 1 ad. Obergesteln VS et Oberwald VS (A.Gerber, U.Glutz), 9.6. 1 chanteur Realp UR (K.Colombo), 11.6. 1 ad., 1 imm. et un ind. type femelle Göschenen UR (A.Borgula, H.Bolzern), 16.6. 1 ad. Lauenen BE (R.Hauri), 19.6. 1 imm. Ulrichen VS (S.Bächli), 30.6. 1 ad. All'Acqua TI (R.Kunz), 11.7. 1 ad. et 1 Tschamut GR (T.Stahel), 31.7. 1 ad. Kandersteg BE (M.Camici).

Bruant jaune: à noter 16.7. 1 chanteur St-Martin VS à 2190 m (B.Posse), très haut!

Bruant ortolan: passage noté du 7.4. au 15.5. en 69 carrés kilométriques, max. 29.4. 15 ind. Ins BE (P.Mosimann-Kampe), 1.5. min. 15 ind. Turtmann VS (C.Sinz).

Bruant proyer: faible présence, tout comme ces dernières années (voir graphique). SOPM=252 ind. (moyenne₁₉₉₅₋₂₀₀₃=378 ind.).



Graummer: Entwicklung der SOPM.

Bruant proyer: évolution des SOPM.

Mitteilungen aus den Überwachungsprojekten *Communications des programmes de suivi avifaunistique*

Monitoring Seltene Brut- und Gastvögel (ID) *Monitoring des nicheurs et hôtes de passages rares (SI)*

Änderungen bei den Artkategorien

Wie im letzten ID-Bulletin angekündigt, wechseln diverse Arten auf den 1. Dezember 2004 die Meldekategorie. Besten Dank allen, die uns ihre Meinung zu den vorgeschlagenen Anpassungen mitgeteilt haben. Wir haben die Vorschläge so weit wie möglich berücksichtigt. Sie finden die definitiven Änderungen in untenstehender Liste.

		alt	neu
900	Schellente	C	B
1090	Rotmilan	B	BH
1670	Wasserralle	B	A
3610	Rauchschwalbe	H	C
4930	Wiesenpieper	B	BH
5000	Bergpieper	C	H
5030	Bachstelze	C	H
4750	Waldlaubsänger	C	B
4720	Fitis	C	B
5390	Alpenbirkenzeisig	B	BH
5450	Zitronengirlitz	B	BH
5740	Rohrhammer	C	H

Changements de catégories

Comme annoncé dans le dernier bulletin, plusieurs espèces changeront de catégorie dès le 1^{er} décembre 2004. Merci à celles et ceux qui nous ont communiqué leur avis sur les changements proposés. Nous en avons tenu compte dans la mesure du possible pour établir la liste définitive que vous trouvez ci-dessous.

		Ancien	Nouveau
900	Garrot à œil d'or	C	B
1090	Milan royal	B	BH
1670	Râle d'eau	B	A
3610	Hirondelle rustique	H	C
4930	Pipit farlouse	B	BH
5000	Pipit spioncelle	C	H
5030	Bergeronnette grise	C	H
4750	Pouillot siffleur	C	B
4720	Pouillot fitis	C	B
5390	Sizerin cabaret	B	BH
5450	Venturon montagnard	B	BH
5740	Bruant des roseaux	C	H

Monitoring Überwinternde Wasservögel *Monitoring hivernal des oiseaux d'eau*

Ergebnisse Winter 2003/04

Die im letzten ID-Bulletin aufgrund der provisorischen Zahlen erwähnte Tendenz hat sich bestätigt: Ein für die meisten Arten durchschnittlicher Winter, besonders was die Januarzahlen betrifft. Im November lag das Total der Wasservögel mit 589'000 deutlich über dem Januarwert (563'000). Dazu beigetragen haben unter anderen die Kolbenenten, deren Bestand mit fast 25'000 Individuen nochmals um rund 1000 Individuen über dem bisherige Maximum lag. Die guten Zählbedingungen im November trugen wohl auch zur hohen Gesamtzahl bei: So wurden über 48'000 Haubentaucher gezählt, gegenüber einem Mittel von rund 30'000 in den letzten zehn Jahren.

Die Ergebnisse werden wir in einem Bericht zusammenstellen, der im Verlauf des Winters zur Verfügung stehen wird.

Zählungen 2004/05

Die nationalen Zählungen finden an folgenden Wochenenden statt:

- 14. November 2004
- 16. Januar 2005

Résultats de l'hiver 2003/04

La tendance annoncée dans le dernier bulletin SI s'est confirmée avec les chiffres définitifs: ce fut un hiver tout à fait dans la moyenne pour la plupart des espèces, en particulier en janvier. Le total de 589'000 oiseaux recensés en novembre fut cependant bien au-dessus des chiffres de janvier (563'000). Les Nettes rousses ont largement contribué à ce résultat élevé, avec un total de 25'000 ind., soit 1'000 de plus que le maximum précédent. Les bonnes conditions de recensement en novembre ont probablement aussi joué un rôle: 48'000 Grèbes huppés ont ainsi été comptés, contre une moyenne d'env. 30'000 ces dix dernières années.

Les résultats seront à nouveau présentés dans un rapport, qui sera à disposition dans le courant de l'hiver.

Recensements 2004/05

Les dates suivantes ont été retenues:

- 14 novembre 2004
- 16 janvier 2005

Neue Zählerinnen und Zähler gesucht

Für fast alle „frei gewordenen“ Zählstrecken haben wir bereits Verantwortliche gefunden. Herzlichen Dank allen für die Bereitschaft, bei den Wasservogelzählungen mitzumachen. Noch sind folgende Zählstrecke neu zu besetzen:

- 1.3100: Hochrhein: EW Rekingen bis Zurzach
4.0700: Glatt: Oberhöri Brücke bis Glattfelden

Erfassungsprogramm

Das im letzten Winter zu Testzwecken abgegebene Eingabeprogramm wird rechtzeitig auf die neue Saison hin in überarbeiteter Version auf deutsch, französisch und italienisch vorliegen. Sie können es von der Webseite www.vogelwarte.ch/id herunterladen oder bei uns eine CD bestellen.

Nous recherchons de nouveaux recenseurs

Nous avons déjà trouvé des responsables pour la plupart des secteurs devenus «libres». Un grand merci pour votre participation aux recensements! Les secteurs suivants doivent encore être attribués:

- 1.3100: *Rhin supérieur: Rekingen centrale électrique à Zurzach*
4.0700: *Glatt: Oberhöri pont à Glattfelden*

Programme de saisie informatique

Une nouvelle version du programme de saisie distribué l'an passé dans sa version test sera disponible pour les recensements de cet hiver, en français, allemand et italien. Il pourra être téléchargé sur le site internet du SI www.vogelwarte.ch/si ou commandé sur CD chez nous.

Mitteilung der Schweiz. avifaunistischen Kommission (SAK) *Communication de la Commission de l'avifaune suisse (CAvS)*



Nachfolgend die aktuellen Seltenheitsbeobachtungen, für welche Beobachtungsprotokolle vorliegen. Alle aufgeführten Fälle sind hängig (Ausnahme: mit * bezeichnete sind bereits angenommen) und mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren. Die Entscheide der Kommission werden alljährlich im Ornithologischen Beobachter und in Nos Oiseaux publiziert. Die neusten Entscheide sind jeweils im Internet abrufbar: www.vogelwarte.ch/sak_d.html.

*Observations d'oiseaux rares, pour autant qu'un protocole soit disponible. Ces cas n'ont pas encore été homologués (exception: les données suivies d'un * ont déjà été acceptées) et doivent donc être traités avec les précautions habituelles. Les décisions de la commission sont publiées chaque année dans Nos Oiseaux et Der Ornithologische Beobachter. Les décisions les plus récentes peuvent être consultées sur le site internet www.vogelwarte.ch/sak_f.html.*

Eingereichte Protokolle *protocoles reçus*

Eistaucher/Plongeon imbrin: Kesswil TG, 15.–28.4., ad.

Rosaflamingo/Flamant rose: Chablais de Cudrefin VD, 15.6.–14.7., immat.

Marmelente/Sarcelle marbrée: Winznau SO, 15.–16.5., ad. Aegelsee TG, 19./21.5., ad. Marin NE, 19.6./20.7. Greifensee ZH, 25.6. Rottenschwil AG, 4.–13.7., ad. Chavornay VD, 3.8., 2 Ind., 5.–13.8., 1 Ind.

Gänsegeier/Vautour fauve: Creux-du-Van/Gorgier NE, 12.6. Alp Salaz/Untervaz GR, 28.6.

Schlangenadler/Circaète Jean-le-Blanc: Kandersteg BE, 11.7., 2 Ind. Avusy GE, 27.7.

Adlerbussard/Buse féroce: Hirzel ZH, 11.5.*

Rötelfalke/Faucon crécerellette: Kaltbrunner Riet SG, 27.4.,

Zwergsumpfhuhn/Marouette de Baillon: Greifensee/Uster ZH, 22.4., rufend/ch.

Steppenkiebitz/Vanneau sociable: Flachsee Unterlunkhofen AG, 29.3., ad.*

Zwergstrandläufer/Bécasseau minute: Sionnet GE, 16.–17.3., ad.

Sumpfläufer/Bécasseau falcinelle: Chablais de Cudrefin VD, 30.4.–6.5. Klingnauer Stausersee AG, 31.5.–1.6.

Teichwasserläufer/Chevalier stagnatile: Flachsee/ Unterlunkhofen AG, 23.7., 1.KJ Klingnauer Stausee AG, 24./26.–27.7., 1.KJ Nuolener Ried SZ, 30.7., ad.

Odinshühnchen/Phalarope à bec étroit: Léman zwischen/entre Allaman VD und Excenevex F, 9.8., 1.KJ

Schmarotzerraubmöwe/Labbe parasite: Léman zwischen/entre Allaman VD und Excenevex F, 7.7., subad.

Schmarotzer- oder Spatelraubmöwe/Labbe parasite ou pomarin: Stäfa ZH, 3.7., 2 ad.

Falkenraubmöwe/Labbe à longue queue: Fanel NE, 29.6., ad.

Lachseeschwalbe/Sterne hansel: Fanel BE/ Chablais de Cudrefin VD, 22.6., 2 ad. Chavornay VD, 29.7.

Küstenseeschwalbe/Sterne arctique: Thun BE, 9.5. Chablais de Cudrefin VD, 3.6.

Zwergohreule/Petit-duc scops: Piano di Magadino TI, 13.4.-30.5., mehrere Rufer/*plusieurs ch.* Monte Caslano TI, 13.5., rufend/*ch.* Fanel BE, 19.5., rufend/*ch.* Oleyres VD, 30.5.–6.6., rufend/*ch.*

Weissrückenspecht/Pic à dos blanc: eine Brut und eine weitere Beobachtung in Graubünden sowie eine Beobachtung im Kanton St.Gallen/*une nichée et une autre observation dans les Grisons, une observation dans le canton de St-Gall*

Kalenderlerche/Alouette calandre: Martigny VS, 9./11.4., singend/*ch.*

Kurzzehenlerche/Alouette calandrelle: Sennwald SG, 29.5.

Rötelschwalbe/Hirondelle rousseline: Cadenazzo TI, 20.4.* Schmerikon SG, 6.5. St-Sulpice VD, 8.5.*

Schafstelze/Bergeronnette printanière: Chrümmler FR, 3.4., mit den Merkmalen der Mischform/*présentant les caractères de la forme "superciliaris"**

Unterart/sous-espèce *M. f. flavissima*: Les Grangettes VD, 14.4., * Chrümmler FR, 22.4., * Basel BS, 1.5.,

Unterart/sous-espèce *M. f. feldegg*: Klingnauer Stausee AG, 18.4., * Préverenges VD, 23.4., * Préverenges VD, 30.4.–2.5. Reussdelta UR, 8.5., Rüti bei Büren BE, 10.5., *

Braunkehlchen/Tarier des prés: Zernez GR, 18.3.*

Seidensänger/Bouscarle de Cetti: Maggiadelta/ Ascona TI, 13.3.–25.7., singend/*ch.* Gudo TI, 5.6., singend/*ch.*

Cistensänger/Cisticole des joncs: Laconnex GE, 8.8., singend/*ch.*

Schlagschwirl/Locustelle fluviatile: Kestenholz SO, 18.5., singend/*ch.*

Orpheusspötter/Hypolais polyglotte: Kaltbrunner Riet SG, 12.5., singend/*ch.* Oberriet SG, 18.6.–7.7., singend/*ch.*

Weissbartgrasmücke/Fauvette passerinette: Lodrino TI, 5.4., * Bolle di Magadino TI, 1.5., 2.KJ La Chaux-du-Milieu NE, 11.5.,

Samtkopfgasmücke/Fauvette mélanocéphale: Sins AG, 1.4., * Boll BE, 6.4., * Vico Morcote TI, 7.5.,

Schwarzstirnwürger/Pie-grièche à poitrine rose: Hombrechtikon ZH, 2.6. Kaltbrunner Riet SG, 24.6.

Buchfink/Pinson des arbres Unterart *Fringilla coelebs africana*: Lausanne VD, 30.–31.1.,

Schneeammer/Bruant des neiges: Wyssachen BE, 7.3.*

Kappenammer/Bruant mélanocéphale: Rüti bei Büren BE, 6.6., singend/*ch.*

Der Inhalt des Bulletins dient der persönlichen Information und darf ohne vorherige Zustimmung der Schweizerischen Vogelwarte auch auszugsweise nicht anderswo publiziert werden.

Sempach, 25. August 2004
Bernard Volet, Anatole Gerber, Marcel Burkhardt

Les bulletins du Service d'information ornithologique servent à votre information personnelle et leur contenu ne doit pas être publié ailleurs sans l'autorisation de la Station ornithologique suisse.

Sempach, 25 août 2004
Bernard Volet, Anatole Gerber, Marcel Burkhardt

Redaktionsschluss nächstes Bulletin:
10. Dezember 2004

Prochain délai de rédaction:
10 décembre 2004

