Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Eisvogel | Martin pescatore | pestgaderin | Common Kingfisher

Ruedi Aeschlimann

Longueur et envergure: 16–17 cm : 24–26 cm
Poids: 40–45 g
Habitat: lacs, cours d'eau, zones humides
Nourriture: poissons
Site de nidification: galeries creusées
Ponte: 2–3 pontes à 6–7 œufs par année
Durée d'incubation: 18–21 jours
Envol à l'âge de: 23–27 jours
Comportement migrateur: sédentaire et migrateur à courte distance
Statut: nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent
Effectif nicheur: 300–350 couples
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse: vulnérable



Impossible à confondre, avec ses parties supérieures bleu chatoyant, ses parties inférieures orange et la tache blanche de chaque côté du cou; chez la femelle (à gauche sur la photo), mandibule inférieure rouge; chez le juvénile, bec plus court à pointe claire, pattes grisâtres.

Sur la photo, une femelle martin-pêcheur est en train de donner un poisson de belle taille à un juvénile prêt à l'envol. Celui-ci l'engloutira aussitôt, en commençant toujours par la tête. C'est le seul moyen d'éviter que les nageoires, qui présentent des rayons piquants chez certains poissons, ne descendent de travers et ne s'accrochent dans l'œsophage, ce qui pourrait étouffer l'oiseau.

Il est probable que la branche sur laquelle les oiseaux sont posés se trouve dans une gravière ou sur la berge escarpée d'une petite rivière, non loin de la paroi verticale en terre qui abrite la galerie de la famille. Pour vivre, le martin-pêcheur d'Europe doit en outre disposer d'eaux claires et poissonneuses, au courant faible, et d'un nombre suffisant de perchoirs pour la pêche. Il trouve ces habitats adaptés dans les zones basses où, en général, les cours d'eau ne gèlent pas en hiver. En effet, en cas de gel persistant, de nombreux martins-pêcheurs restés chez nous durant l'hiver meurent. Les individus qui ont passé la saison froide dans le Midi de la France ou en Espagne sont alors avantagés. Grâce à leur fécondité élevée, les martins-pêcheurs sont en mesure de compenser rapidement des pertes, même sensibles. Malgré les fortes fluctuations d'effectifs, les populations indigènes sont demeurées largement stables ces dernières années.

Vögel in der Schweiz_Buch.indb 147 25.01.2013 14:55:11