



Schweizerische Vogelwarte
Informationsdienst
6204 Sempach
Tel 041 462 97 00 / 462 97 26
Fax 041 462 97 10
E-Mail id@vogelwarte.ch




Sempach, 20. September 2002

B.Volet, M.Burkhardt & H.Schmid

News

- Zahlreiche Nachtkeiler
- Guter Durchzug von Sichelstrandläufern
- Haubenlerche singt nahe der Schweizer Grenze
- Brachpieper singt auf 2500 m
- Rotsterniges Blaukehlchen auf Expansionskurs
- Invasion von Fichtenkreuzschnäbeln



- Bihoreaux présents en nombre
- Fort passage de Bécasseaux cocorlis
- Cochevis chanteur près de la Suisse
- Pipit rousseline cantonné à 2500 m
- Gorgebleue à miroir roux en expansion
- Invasion de Bec-croisés

Meteo

Der Juni war in der ganzen Schweiz sehr sonnig und heiss. An den meisten Orten war es der wärmste Juni seit Messbeginn 1864. Die Niederschläge blieben unterdurchschnittlich, einzig in einigen Gebieten der Alpen und auf der Südseite brachten heftige Gewitter überdurchschnittliche Niederschlagswerte.

Wechselhaftes Wetter führte im Juli und August zu einem Sonnenscheindefizit, wohingegen die Temperaturen im Bereich des Mittelwertes lagen. Häufige Störungen brachten in weiten Teilen der Schweiz überdurchschnittliche Regenmengen, was durch lokale und zum Teil heftige Gewitter verstärkt wurde.

N = Niederschlagsmenge, in % der Norm

S = Sonnenscheindauer, in % der Norm

T = Temperatur, Abweichung von der Norm

Basel	Juni			Juli			Aug.											
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)									
Zürich	91	119	126	68	93	113	130	89	82	141	97	90	3	0.1	0.7	4	0.6	1

Bern	Juni			Juli			Aug.											
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)									
St. Gallen	71	158	149	142	121	211	127	90	88	132	91	88	3.5	0.4	0.2	4	0.6	0.6

Engelberg	Juni			Juli			Aug.											
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)									
Davos	109	107	121	76	93	142	137	94	86	136	90	86	3.7	0.5	0.6	4	1	0.8

Genève-Cointrin	Juni			Juli			Aug.											
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)									
La Chaux-de-Fonds	83	205	132	53	130	238	130	97	88	141	85	74	3.8	0.5	0.2	3.8	0.2	0.6

Sbn	Juni			Juli			Aug.											
	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)	N (%)	S (%)	T (+/-)									
Locarno-Monti	114	134	121	96	181	94	120	90	85	115	87	96	3.3	0.4	0.6	3.1	-0.4	0.1

Juin fut très ensoleillé et chaud dans toute la Suisse. Ce fut même le record de chaleur pour ce mois en plusieurs endroits depuis le début des mesures en 1864. Les précipitations restèrent en dessous de la moyenne, sauf par endroits dans les Alpes et sur leur versant sud, où des orages violents provoquèrent un surplus de précipitations.

Le temps changeant de juillet et d'août provoqua un déficit d'ensoleillement mais les températures restèrent toutefois normales. Des perturbations fréquentes causèrent des précipitations plus abondantes qu'en moyenne, ce qui fut accentué localement par des orages parfois violents.

N = précipitations, % de la norme

S = ensoleillement, % de la norme

T = température, différence de la norme

Nächster Redaktionsschluss: 10. Dez. 2002

Prochain délai de rédaction: 10 déc. 2002

Der Inhalt des Bulletins dient der persönlichen Information und darf ohne vorherige Zustimmung der Schweizerischen Vogelwarte auch auszugsweise nicht anderswo publiziert werden.

Les bulletins du Service d'information ornithologique servent à votre information personnelle et leur contenu ne doit pas être publié ailleurs sans l'autorisation de la Station ornithologique suisse.



Top 10

Arten				Espèces
>1000 m ü.M.	Baumpieper	254	Pipit des arbres	>1000 m
	Steinschmätzer	227	Traquet motteux	
	Braunkehlchen	202	Tarier des prés	
	Alpenbirkenzeisig	166	Sizerin cabaret	
	Alpenbraunelle	148	Accenteur alpin	
	Kuckuck	131	Coucou gris	
	Klappergrasmücke	124	Fauvette babillarde	
	Felsenschwalbe	110	Hirondelle de rochers	
	Ringdrossel	98	Merle à plastron	
	Schneesperling	94	Niverolle alpine	
Gebiete	Zermatt VS	146	Zermatt VS	Localités
>1000 m ü.M.	Le Chenit VD	134	Le Chenit VD	>1000 m
	Quinto TI	97	Quinto TI	
	Olivone TI	96	Olivone TI	
	Scuol GR	90	Scuol GR	
	Pontresina GR	59	Pontresina GR	
	Tujetsch GR	49	Tujetsch GR	
	Sils im Engadin/Segl GR	43	Sils im Engadin/Segl GR	
	Arosa GR	40	Arosa GR	
	Ramosch GR	38	Ramosch GR	

Beobachtungen

Dieses Bulletin wurde auf der Basis von 21959 computererfassten Meldungen erstellt, wovon uns 47% via IDEXT übermittelt wurden. Ganz herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben!

Abkürzungen:

M = Männchen W = Weibchen Fam. = Familie
SOPM = Summe der Ortspentadenmaxima. Ohne andere Angabe bezieht sich diese auf die Monate Juni bis August.

Rothalstaucher: 25.6. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann), 19.7. 1 Ind. Maur ZH (R.+O.Rohweder), 25.8. 3 Ind. Sciez F (S.Antoniazza, J.Duplain, L.Maumary), 4.9. 1 Ind. Chavornay VD (J.-M.Duflon), 9.9. 2 Ind. Pfäffikersee ZH (W.Hunkeler).

Schwarzhalstaucher: U.a. 21.7. 1 ad. mit 2 juv. Greifensee ZH (P.J.Brändli). Daneben 28.8. ca. 3000 Ind. auf einer ca. 10 km² grossen Fläche des Genfersees (J.Duplain).

Kormoran: Auf der Berner Insel am Fanel BE erstellten vermutlich 7 Paare insgesamt 8 Nester und erbrüteten 14 Junge (Zusammenstellung J.Hassler).

Rohrdommel: 8./17.8., 1.9. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann, T.Stahel), 11./19./24.8. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (div. Beob.), 22.8. 1 Ind. Leuk VS (S.Ehrenbold), 25.8., 3./7.9. 1 Ind. Fanel BE (div. Beob.).

Rallenreier: 23.6. 2 Ind. Oberkirch LU (J.Hofer), 17./19.7. 1 Ind. Boécourt JU (J.-M.Gisiger), 4.8. Rhein-delta A (C.Meier-Zwicky).

Kuhreier: 18.6. 7 Ind. Lancy GE (Y.Schmidt), 29.6.-12.9. 1 Ind. im Raum Wauwilermoos-Ostergau LU (div. Beob.).

Seidenreier: Gute Präsenz mit Beobachtungen von 1-4 Ind. aus 19 Kilometerquadraten. SOPM=86 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=74 Ind.).

Observations

Ce bulletin a été réalisé sur la base de 21959 données informatisées, dont 47% nous sont parvenues par IDEXT. Un grand merci à tous ceux qui ont participé!

Abréviations:

m. = mâle, f. = femelle, fam. = famille, ch. = chanteur
SOPM = Somme des maxima par pentade et par lieu. Sauf indication contraire, se rapporte à la période allant de juin à août.

Grèbe jougris: 25.6. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann), 19.7. 1 ind. Maur ZH (R.+O.Rohweder), 25.8. 3 ind. Sciez F (S.Antoniazza, J.Duplain, L.Maumary), 4.9. 1 ind. Chavornay VD (J.-M.Duflon), 9.9. 2 ind. Pfäffikersee ZH (W.Hunkeler).

Grèbe à cou noir: à noter 21.7. 1 ad. avec 2 juv. Greifensee ZH (P.J.Brändli), 28.8. env. 3000 ind. sur 10 km² du Léman (J.Duplain).

Grand Cormoran: 8 nids (dont une seconde ponte) produisent 14 jeunes sur l'île bernoise du Fanel (J.Hassler).

Butor étoilé: 8./17.8., 1.9. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (J.Hartmann, T.Stahel), 11./19./24.8. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (div. observateurs), 22.8. 1 ind. Leuk VS (S.Ehrenbold), 25.8., 3./7.9. 1 ind. Fanel BE (div. observateurs).

Crabier chevelu: 23.6. 2 ind. Oberkirch LU (J.Hofer), 17./19.7. 1 ind. Boécourt JU (J.-M.Gisiger), 4.8. Rhein-delta A (C.Meier-Zwicky).


Héron garde-bœufs: 18.6. 7 ind. Lancy GE (Y.Schmidt), 29.6.-12.9. 1 ind. dans la région du Wauwilermoos-Ostergau LU (div. observateurs).

Aigrette garzette: bonne présence: mentions de 1-4 ind. en 19 carrés kilométriques. SOPM=86 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=74 ind.).



Silberreiher: Erneut starkes Auftreten in den Sommermonaten mit Beobachtungen von 1-11 Ind. aus 31 Kilometerquadraten. SOPM=119 Ind. (2001=126 Ind.).

Nachtreiher: Überdurchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen von 1-5 Ind. aus 37 Kilometerquadraten. SOPM=134 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=69 Ind.).



Bihoreau gris: présence en dessus de la moyenne: observations de 1-5 ind. dans 37 carrés kilométriques. SOPM=134 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=69 ind.).

Purpureiher: wahrscheinliche Brut am Fanel BE: 3.8. ein vermutlich noch nicht flügger Jungvogel an einer Stelle, wo die Altvögel während der ganzen Brutsaison präsent waren (A.Mischler, P.Mosimann-Kampe u.a.), dazu bestand noch für ein zweites Paar Brutverdacht. Überdurchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen von 1-2 Ind. aus 22 Kilometerquadraten. SOPM=50 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=27 Ind.).

Schwarzstorch: Durchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen aus 25 Kilometerquadraten. U.a. 8.9. 10 Ind. Gurten BE (P.Lustenberger). SOPM=25 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=24 Ind.).

Weisstorch: U.a. 19.8. 2 Ind. über dem Lukmanierpass GR auf 4000 m ü.M. mit Segelflugzeug kreisend (P.Hanhart), 9.9. 2 Ind. San Bernardino GR auf 2070 m ü.M. (Herr Boner).

Löffler: 26.6. bis 6.7. 1 Ind. Uster ZH (div. Beob.), 20.7. 1 Ind. Rhein bei Eglisau ZH (B.Braunschweiler).

Rostgans: Neben den bereits im ID 241 erwähnten 7 Bruten: 1 Brut mit 7 Jungen in Eulenkasten Altwis LU (M.Thoma). Daneben: 24.7. mind. 120 Ind. Greifensee ZH (H.-U.Dössegger), 15.9. 152 Ind. Klingnauer Stausee AG (S.Stutz). Erneut starkes Auftreten in den Sommermonaten. SOPM=2339 Ind. (2001=2280 Ind.).

Brandgans: Überdurchschnittlicher Durchzug mit Beobachtungen aus 13 Kilometerquadraten. U.a. 6.7. 19 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin (S.Bachmann, E.Bernardi, M.Gerber), 7.9. 12 Ind. Klingnauer Stausee AG (M.Alig). SOPM=104 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=51 Ind.).

Kolbenente: Bisher wurden 77 Bruten gemeldet! Neben den bereits im ID 241 erwähnten: Schaffhausen Engeweiher SH 1 (M.Roost), Kaltbrunner Riet SG 1 (H.Geisser, F.Iff), Schmerikon SG 1 (K.Anderegg, H.Geisser), Rapperswil SG nun 11 Fam., dazu junge Kolbenenten in 5 Stockentenfam., in 1 Reiherentenfam., in 1 Tafelentenfam. und in 1 Eiderentenfam. (K.Anderegg), Klingnauer Stausee AG 4 (J.Hartmann u.a.), Luzern nun 14 (A.Borgula, R.Bryant u.a.), Stansstad NW 1, hier erstmals (R.Hauri), Alpnacherried OW 1 (S.Trinkler), Reussdelta UR nun 2 (H.Schmid, R.Hardegger, S.Wechsler), Thunersee BE nun 16 (R.Hauri, P.Blaser u.a.), Wohlen BE

Grande Aigrette: présence estivale à nouveau marquée: mentions de 1-11 ind. en 31 carrés kilométriques. SOPM=119 ind. (2001=126 ind.).

Héron pourpré: nidification probable au Fanel BE: 3.8. 1 juv. probablement incapable de voler, vu dans un endroit où des adultes étaient régulièrement présents toute la saison (A.Mischler, P.Mosimann-Kampe et al.); soupçon de nidification pour un 2^e couple. Présence en dessus de la moyenne: mentions de 1-2 ind. en 22 carrés kilométriques. SOPM=50 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=27 ind.).

Cigogne noire: passage moyen en 25 carrés kilométriques. A noter 8.9. 10 ind. Gurten BE (P.Lustenberger). SOPM=25 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=24 ind.).

Cigogne blanche: à noter 19.8. 2 ind. en compagnie d'un planeur au-dessus du col du Lukmanier GR à 4000 m (P.Hanhart), 9.9. 2 ind. San Bernardino GR à 2070 m (Monsieur Boner).

Spatule blanche: 26.6.-6.7. 1 ind. Uster ZH (div. observateurs), 20.7. 1 ind. Rhein bei Eglisau ZH (B.Braunschweiler).

Tadorne casarca: en plus des 7 familles citées dans le bulletin 241: 1 nichée de 7 jeunes dans un nichoir à chouette Altwis LU (M.Thoma). A part cela, 24.7. min. 120 ind. Greifensee ZH (H.-U.Dössegger), 15.9. 152 ind. Klingnauer Stausee AG (S.Stutz). Présence estivale à nouveau très marquée. SOPM=2339 ind. (2001=2280 ind.).

Tadorne de Belon: présence au-dessus de la moyenne notée en 13 carrés kilométriques. Entre autres 6.7. 19 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin (S.Bachmann, E.Bernardi, M.Gerber), 7.9. 12 ind. Klingnauer Stausee AG (M.Alig). SOPM=104 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=51 ind.).

Nette rousse: 77 nidification signalées jusqu'ici! A côté des cas déjà cités dans le bulletin 241: Schaffhausen Engeweiher SH 1 (M.Roost), Kaltbrunner Riet SG 1 (H.Geisser, F.Iff), Schmerikon SG 1 (K.Anderegg, H.Geisser), Rapperswil SG 11 fam. en tout, sans compter les jeunes Nettes présentes dans 5 fam. de Colverts., 1 fam. de Morillons, 1 fam. de Milouins et 1 fam. d'Eiders (K.Anderegg), Klingnauer Stausee AG 4 (J.Hartmann et al.), Luzern 14 en tout (A.Borgula, R.Bryant et al.), Stansstad NW 1, nouveau site (R.Hauri), Alpnacherried OW 1 (S.Trinkler), Reussdelta UR 2 en tout (H.Schmid, R.Hardegger, S.Wechsler), Thunersee BE 16 en tout (R.Hauri,



1, hier erstmals (S.Bachmann), Biel BE 1 hier erstmals (P.Rapin, F.Schneider), Fanel BE insgesamt 14-19 Gelege sowie 3 Mischgelege auf Neuenburger- und Seeschwalbeninsel (P.Rapin), Portalban FR 1 (W.Fuchs), Yvonand VD nun 2 (S.Antoniazza), Lutry VD 1 (A.Eray), Ouchy VD 1 (L.Maumary), Genève 1 (C.Guex).

Tafelente: Neben der bereits im ID 241 gemeldeten Brut: 4.7. 1 Fam. mit 5 Jungen Wichelsee OW (S.Erni), eine 2. Fam. mit 5 Jungen Rapperswil SG (K.Anderegg).

Reiherente: Bisher wurden 133 Bruten gemeldet: La Punt GR 1 (W.Bürkli, M.+F.Suter), Gravatschweiher GR 3-4 (K.Fischer, F.Sigg, B.+J.Meister), Samedan GR 1 (W.Bürkli), Sils im Engadin GR 1 (B.+J.Meister), Arosa GR 2 (J.Jelen, C.Meier-Zwicky), Heidsee Lenzerheide GR 11 (J.Jelen), Kaiseraugst AG 2 (G.Oesterhelt u.a.), Münchenstein BL 4 (B.Pfarr-Gambke u.a.), Husemersee ZH 1 (H.Dähler), Kaltbrunner Riet SG 2 (G.Ebnetter, H.Geisser), Nuolener Ried SZ 1 (L.Hüppin, E.Grether), Rapperswil SG 2, daneben 1 Fam. mit 3 Jungen und 2 Stockentenjungern und junge Reiherenten in 1 Stockentenfam. (K.Anderegg u.a.), Reussdelta UR 9 (div. Melder), Brunnen SZ 3 (P.Kühne), Küssnacht am Rigi SZ 1 (G.Bachmann), Wichelsee OW 7 (S.Trinkler u.a.), Unterseen BE 1 (P.E.Zingg), Weissenau BE 2 (P.Blaser, R.Hauri, M.Wettstein), Merligen BE 1 (P.Blaser, R.Hauri), Unterer Thunersee BE 4 (R.Hauri u.a.), Elfenau BE 4 (R.Hauri), Wohlensee BE 1 (S.Schenk), Inkwilersee SO 2 (P.Frara, P.Feuz, F.Kurz), Gerlafinger Weiher SO 1 (K.Eigenheer, R.Hauri), Vogelraupfi BE 3 (K.Eigenheer), Klingnauer Stausee AG 13 (J.Hartmann u.a.), Lenkersee BE 14 (R.Hauri), Forellensee Zweisimmen BE 1 (R.Hauri), Rühlensee BE 1 (K.Rössti), Lauenensee BE 6 (R.Hauri), Biel BE 1, hier erstmals (P.Rapin, A.Rossi), Lac de Joux VD 2 (C.Guex, C.Vaucher), Chavornay VD 1 (A.Zeender), Marais de Grône VS 8 (H.Duperrex, J.Rey u.a.), Lac de Bretaye VD 2 (J.-P.Reitz, F.Klötzli), Les Grangettes VD 8 (A.Eray, H.Duperrex, M.Dvorak), Montreux VD 3 (A.Eray), Corseaux VD 1 (A.Eray), Chardonne VD 1 (A.Eray), Lutry VD 1 (A.Eray).

Mittelsäger: 16./17.6. 1 Ind. Luterbach SO (P.Frara, K.Eigenheer), ab 13.7. 1-4 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beob.).

Wespenbussard: Durchschnittlicher Durchzug. U.a. 25.8. 288 Ind., 27.8. 231 Ind., 28.8. 348 Ind. Gurten BE (P.Lustenberger), 28.8. 219 Ind. Thalheim AG (M.+F.Suter, A.Sutter), 4.9. 379 Ind. Eschenbach LU (M.Thoma), 4.9. 225 Ind., 5.9. 207 Ind. Gurten BE (P.Lustenberger). SOPM=1292 Ind. (Mittel₁₉₉₇₋₂₀₀₁=1362 Ind.).

Schlangenadler: 15./17./18./21.6., 19./22.7. 1 Ind. Leuk VS (J.Rey, M.Baumann, H.Duperrex), 22.6., 5./11.7., 5.8. 1 Ind. Chamoson VS (A.Aebischer, H.Duperrex, B.Posse), 11.7. 1 Ind. Leytron VS (H.Duperrex), 11./27.7., 16./20.8., 1-2 Ind. Fully VS (R.Arlettaz, H.Duperrex, B.Posse, L.Maumary), 28.7. 1 Ind. Conthey VS (B.Posse).

Kornweihe: 1.9. 2 Ind., 7.9. 3 Ind. Portalban FR (P.Rapin), 13.9. 1 Ind. Reussdelta UR (E.Arnold), 14.9. 1 Ind. Tschappina GR (C.Meier-Zwicky).

P.Blaser et al.), Wohlen BE 1, nouveau site (S.Bachmann), Bienne BE 1, nouveau site (P.Rapin, F.Schneider), Fanel BE 14-19 pontes plus 3 pontes mixtes sur l'île neuchâteloise et l'îlot à sternes (P.Rapin), Portalban FR 1 (W.Fuchs), Yvonand VD 2 en tout (S.Antoniazza), Lutry VD 1 (A.Eray), Ouchy VD 1 (L.Maumary), Genève 1 (C.Guex).

Fuligule milouin: en plus des fam. déjà citées: 4.7. 1 fam. de 5 jeunes Wichelsee OW (S.Erni), une 2^e fam. de 5 jeunes Rapperswil SG (K.Anderegg).

Fuligule morillon: 133 cas de nidifications signalés jusqu'ici: La Punt GR 1 (W.Bürkli, M.+F.Suter), Gravatschweiher GR 3-4 (K.Fischer, F.Sigg, B.+J.Meister), Samedan GR 1 (W.Bürkli), Sils im Engadin GR 1 (B.+J.Meister), Arosa GR 2 (J.Jelen, C.Meier-Zwicky), Heidsee Lenzerheide GR 11 (J.Jelen), Kaiseraugst AG 2 (G.Oesterhelt et al.), Münchenstein BL 4 (B.Pfarr-Gambke et al.), Husemersee ZH 1 (H.Dähler), Kaltbrunner Riet SG 2 (G.Ebnetter, H.Geisser), Nuolener Ried SZ 1 (L.Hüppin, E.Grether), Rapperswil SG 2, plus 1 fam. de 3 jeunes avec 2 jeunes Colverts ainsi que des jeunes Morillons dans 1 fam. de Colverts (K.Anderegg et al.), Reussdelta UR 9 (div. Melder), Brunnen SZ 3 (P.Kühne), Küssnacht am Rigi SZ 1 (G.Bachmann), Wichelsee OW 7 (S.Trinkler et al.), Unterseen BE 1 (P.E.Zingg), Weissenau BE 2 (P.Blaser, R.Hauri, M.Wettstein), Merligen BE 1 (P.Blaser, R.Hauri), Unterer Thunersee BE 4 (R.Hauri et al.), Elfenau BE 4 (R.Hauri), Wohlensee BE 1 (S.Schenk), Inkwilersee SO 2 (P.Frara, P.Feuz, F.Kurz), Gerlafinger Weiher SO 1 (K.Eigenheer, R.Hauri), Vogelraupfi BE 3 (K.Eigenheer), Klingnauer Stausee AG 13 (J.Hartmann et al.), Lenkersee BE 14 (R.Hauri), Forellensee Zweisimmen BE 1 (R.Hauri), Rühlensee BE 1 (K.Rössti), Lauenensee BE 6 (R.Hauri), Bienne BE 1, nouveau site (P.Rapin, A.Rossi), Lac de Joux VD 2 (C.Guex, C.Vaucher), Chavornay VD 1 (A.Zeender), Marais de Grône VS 8 (H.Duperrex, J.Rey et al.), Lac de Bretaye VD 2 (J.-P.Reitz, F.Klötzli), Les Grangettes VD 8 (A.Eray, H.Duperrex, M.Dvorak), Montreux VD 3 (A.Eray), Corseaux VD 1 (A.Eray), Chardonne VD 1 (A.Eray), Lutry VD 1 (A.Eray).

Harle huppé: 16./17.6. 1 ind. Luterbach SO (P.Frara, K.Eigenheer), dès le 13.7. 1-4 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs).

Bondrée apivore: passage moyen, à noter 25.8. 288 ind., 27.8. 231 ind., 28.8. 348 ind. Gurten BE (P.Lustenberger), 28.8. 219 ind. Thalheim AG (M.+F.Suter, A.Sutter), 4.9. 379 ind. Eschenbach LU (M.Thoma), 4.9. 225 ind., 5.9. 207 ind. Gurten BE (P.Lustenberger). SOPM=1292 ind. (moyenne₁₉₉₇₋₂₀₀₁=1362 ind.).

Circaète Jean-le-Blanc: 15./17./18./21.6., 19./22.7. 1 ind. Leuk VS (J.Rey, M.Baumann, H.Duperrex), 22.6., 5./11.7., 5.8. 1 ind. Chamoson VS (A.Aebischer, H.Duperrex, B.Posse), 11.7. 1 ind. Leytron VS (H.Duperrex), 11./27.7., 16./20.8., 1-2 ind. Fully VS (R.Arlettaz, H.Duperrex, B.Posse, L.Maumary), 28.7. 1 ind. Conthey VS (B.Posse).

Busard St-Martin: 1.9. 2 ind., 7.9. 3 ind. Portalban FR (P.Rapin), 13.9. 1 ind. Reussdelta UR (E.Arnold), 14.9. 1 ind. Tschappina GR (C.Meier-Zwicky).



Wiesenweihe: 16.8. 1 Ind. Payerne VD (P.Rapin), 18./25./28./31.8. 1 Ind., 4.9. 5 Ind. Gurten BE (P.Lustenberger), 27.8. 1 Ind. Dettighofen TG (D.Hagist), 31.8. 2 Ind. Wasserscheide/Gurnigel BE (P.J.Brändli), 2.9. 1 Ind. Choulex GE (A.Bassin), 3./4.9. 1-2 Ind. Wauwilermoos LU (S.Ehrenbold, S.Erni, J.Linggi, B.Volet), 5.9. 1 Ind. Kriens LU (A.Borgula).

Habicht: U.a. 19.8 1 Ind. Hörnlühütte Zermatt VS auf 3400 m ü.M. (E.Gunzinger).

Rotfussfalke: 20.6. 1 Ind. Turtmann VS (H.Duperrex), 8.9. 1 Ind. Kleinbödingen FR (A.Riedo).

Tüpfelsumpfhuhn: Gute Präsenz mit Beobachtungen aus 14 Kilometerquadraten. U.a. 1.8. 9 Ind. Kaltbrunner Riet SG (H.Geisser), 2.8. 8 Ind. Klingnauer Stausee AG (T.Stahel, S.Stutz). SOPM=77 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=54 Ind.).

Kleines Sumpfhuhn: 19.8., 8.9. je 1 Ind. Fanel BE (M.Schweizer, P.Walser).

Wachtelkönig: 18./22.6., 7./12./20.7. 1 Sänger Lützelsee ZH (div. Beob.), 18./23./27.6., 2./7./9./11./13./20.7. bis 3 Sänger Kaltbrunner Riet SG (H.Geisser, L.Hüppin u.a.), 18.6., 14.7. 1 Sänger Ruggeller Riet FL (G.Sieber), 18.6., 21.7. 2 Sänger Tschlin GR (M.Gerber, L.Juillerat, R.+O. Rohweder), 20.6. 1 Sänger Ramosch GR (L.Juillerat), 21./22./29./30.6. 1-2 Sänger Scuol GR (K.+L.Felix), 22./24.6. 1 Sänger Santa Maria Val Müstair GR (H.Gehler), 30.6. 1 Sänger Le Chenit VD (C.Guex), 30.6. 1 Sänger Nuolener Ried SZ (E.Grether, L.Hüppin), 9.7. 1 Ind. Oberried BE (A.Mischler), 12./26.8. 1 Ind. Jona SG, hier scheinbar auch über den Sommer anwesend (K.Anderegg).

Austernfischer: 20.6., 6.8. 1 Ind. Préverenges VD (L.Maumary, L.Vallotton), 28.7. 1 Ind. Gwatt BE (M.Käppeli), 14.8. 1 Ind. Rade de Genève (B.Piot).

Stelzenläufer: 2.7. 1 Ind. Morges VD (L.Vallotton), 14.7. bis 15.8. 2 Ind. Meinier GE (div. Beob.), 14.7., 13.9. 1 Ind. Chablais de Cudrefin VD (S.Bachmann, M.Gerber, P.Rapin). Die Art wird sonst um diese Jahreszeit bei uns selten gesehen.

Mornellregenpfeifer: 18.8. bis 8.9. Beobachtungen von bis 8 Ind. Cassonsgrat GR (div. Beob.), 7.9. 2 Ind. Hinterrugg SG (H.Geisser), 9.9. 2 Ind. Rheindelta A (A.Täschler), 14.9. 1 Ind. Silberer SZ (U.Glutz).

Goldregenpfeifer: 1./7./8.9. 1 Ind. Portalban FR (P.Rapin), 13.9. 2 Ind. Rheindelta A (S.Trinkler), 15.9. 4 Ind. Nuolener Ried SZ (E.Grether).

Kiebitzregenpfeifer: 25.6. 1 Ind. Kanderdelta BE (M.Wettstein), 10.8., 27.-31.8., 14.9. je 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beob.), 10.-13.8. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beob.), 11./12.8. 1-2 Ind. Nuolener Ried SZ (A.Täschler), 13.8. 1 Ind. Rheindelta A (A.Täschler).

Knutt: 13.8. 1 Ind. Verbois GE (P.Blaser), 17.8.-9.9. 1-6 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beob.),

Busard cendré: 16.8. 1 ind. Payerne VD (P.Rapin), 18./25./28./31.8. 1 ind., 4.9. 5 ind. Gurten BE (P.Lustenberger), 27.8. 1 ind. Dettighofen TG (D.Hagist), 31.8. 2 ind. Wasserscheide/Gurnigel BE (P.J.Brändli), 2.9. 1 ind. Choulex GE (A.Bassin), 3./4.9. 1-2 ind. Wauwilermoos LU (S.Ehrenbold, S.Erni, J.Linggi, B.Volet), 5.9. 1 ind. Kriens LU (A.Borgula).

Autour des palombes: à noter 19.8 1 ind. Hörnlühütte Zermatt VS à 3400 m (E.Gunzinger).

Faucon kobez: 20.6. 1 ind. Turtmann VS (H.Duperrex), 8.9. 1 ind. Kleinbödingen FR (A.Riedo).

Marouette ponctuée: bonne présence, détectée en 14 carrés kilométriques. A noter 1.8. 9 ind. Kaltbrunner Riet SG (H.Geisser), 2.8. 8 ind. Klingnauer Stausee AG (T.Stahel, S.Stutz). SOPM=77 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=54 ind.).

Marouette poussin: 19.8. et 8.9. 1 ind. Fanel BE (M.Schweizer, P.Walser).

Râle des genêts: 18./22.6., 7./12./20.7. 1 ch. Lützelsee ZH (div. observateurs), 18./23./27.6., 2./7./9./11./13./20.7. jusqu'à 3 ch. Kaltbrunner Riet SG (H.Geisser, L.Hüppin et al.), 18.6., 14.7. 1 ch. Ruggeller Riet FL (G.Sieber), 18.6., 21.7. 2 ch. Tschlin GR (M.Gerber, L.Juillerat, R.+O. Rohweder), 20.6. 1 ch. Ramosch GR (L.Juillerat), 21./22./29./30.6. 1-2 ch. Scuol GR (K.+L.Felix), 22./24.6. 1 ch. Santa Maria Val Müstair GR (H.Gehler), 30.6. 1 ch. Le Chenit VD (C.Guex), 30.6. 1 ch. Nuolener Ried SZ (E.Grether, L.Hüppin), 9.7. 1 ind. Oberried BE (A.Mischler), 12./26.8. 1 ind. Jona SG, présent à cet endroit apparemment tout l'été (K.Anderegg).

Huitrier pie: 20.6., 6.8. 1 ind. Préverenges VD (L.Maumary, L.Vallotton), 28.7. 1 ind. Gwatt BE (M.Käppeli), 14.8. 1 ind. Rade de Genève (B.Piot).

Echasse blanche: 2.7. 1 ind. Morges VD (L.Vallotton), 14.7.-15.8. 2 ind. Meinier GE (div. observateurs), 14.7., 13.9. 1 ind. Chablais de Cudrefin VD (S.Bachmann, M.Gerber, P.Rapin), l'espèce est habituellement très rare à cette période de l'année.

Pluvier guignard: 18.8.-8.9. jusqu'à 8 ind. Cassonsgrat GR (div. observateurs), 7.9. 2 ind. Hinterrugg SG (H.Geisser), 9.9. 2 ind. Rheindelta A (A.Täschler), 14.9. 1 ind. Silberer SZ (U.Glutz).

Pluvier doré: 1./7./8.9. 1 ind. Portalban FR (P.Rapin), 13.9. 2 ind. Rheindelta A (S.Trinkler), 15.9. 4 ind. Nuolener Ried SZ (E.Grether).

Pluvier argenté: 25.6. 1 ind. Kanderdelta BE (M.Wettstein), 10.8., 27.-31.8., 14.9. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs), 10.-13.8. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs), 11./12.8. 1-2 ind. Nuolener Ried SZ (A.Täschler), 13.8. 1 ind. Rheindelta A (A.Täschler).

Bécasseau maubèche: 13.8. 1 ind. Verbois GE (P.Blaser), 17.8.-9.9. 1-6 ind. Fanel BE/Chablais de Cudre-



1./9./12./14.9. 1 Ind. Rheindelta A (C.Meier-Zwicky, A.Täschler, W.Leuthold-Glinz, P.Knaus), 7.9. 1 Ind. Préverenges VD (E.Bernardi).

Sichelstrandläufer: Überdurchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen von 1-20 aus 28 Kilometerquadraten. U.a. 25.-29.8. mind. 20 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beob.). SOPM=145 Ind. (Mittel¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=46 Ind.).

Uferschnepfe: 6.7. 1 Ind. Neeracherried ZH (L.Senn), 13.7. 1 Ind. Benken SG (H.Geisser), 18.7., 12.8. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (L.Jullierat, M.Schweizer), 29.7. 1 Ind. Yvonand VD (S.Antoniazza), 4.8. 1 Ind. Aareebene BE/SO (K.Eigenheer), 12.8. 1 Ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon, H.Duperrex, L.Maumary).

Pfuhschnepfe: 3.9. 44 Ind. Fanel BE (P.Lustenberger), aussergewöhnlich grosser Trupp, 7.9. 5 Ind., 10./13./14.9. je 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beob.), 7.-12.9. 1 Ind. Thun BE (M.Wettstein, M.Käppeli), 7./9./14.9. 1 Ind. Rheindelta A (G.Sieber, P.Knaus, H.Klopfenstein, A.Täschler), 8.9. 1 Ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon), 12.9. 1 Ind. Uster ZH (M.Widmer).

Regenbrachvogel: Recht guter Durchzug. U.a. 1.8. 12 Ind. Fanel BE (E.Bernardi). SOPM=54 Ind. (Mittel¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=40 Ind.).

Waldwasserläufer: Überdurchschnittliches Auftreten. U.a. 12.8. 15 Ind. Illarsaz VS (R.Voisin), 14.8. 20 Ind. Klingnauer Stausee AG (S.Stutz, W.Zanola). SOPM=615 Ind. (Mittel¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=334 Ind.).

Bruchwasserläufer: Überdurchschnittliches Auftreten. U.a. 11.8. 138 Ind. Nuolener Ried SZ (A.Täschler), neue Höchstzahl für die Schweiz, 12.8. ca. 100 Ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon). SOPM=1392 Ind. (Mittel¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=624 Ind.).

Flussuferläufer: U.a. 3.9. 70 Ind. Préverenges VD (L.Maumary), aussergewöhnlich grosse Ansammlung.

Steinwälder: Recht guter Durchzug mit Beobachtungen von 1-6 Ind. aus 17 Kilometerquadraten. U.a. 8.9. 1 Ind. Cassonsgrat GR auf 2700 m ü.M. (Foto: K.Mettler), eine der ganz wenigen Meldungen aus den Alpen. SOPM=16 Ind. (Mittel¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=12 Ind.).



Unbestimmte Raubmöwe: 7.7. 1 Ind. Solothurn (P.Frara), 25.8. 1 Ind. Léman VD (S.Antoniazza), 29.8. 1 Ind. Champ-Pittet VD (F.Schneider), 1.9. 1 Ind., 9.9. 6 Ind. Chablais de Cudrefin VD (M.Schweizer, P.Rapin).

fin VD (div. observateurs), 1./9./12./14.9. 1 ind. Rheindelta A (C.Meier-Zwicky, A.Täschler, W.Leuthold-Glinz, P.Knaus), 7.9. 1 ind. Préverenges VD (E.Bernardi).

Bécasseau cocorli: passage en dessus de la moyenne: observations de 1-20 en 28 carrés kilométriques. A noter 25.-29.8. min. 20 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs). SOPM=145 ind. (moyenne¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=46 ind.).

Barge à queue noire: 6.7. 1 ind. Neeracherried ZH (L.Senn), 13.7. 1 ind. Benken SG (H.Geisser), 18.7., 12.8. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (L.Jullierat, M.Schweizer), 29.7. 1 ind. Yvonand VD (S.Antoniazza), 4.8. 1 ind. plaine de l'Aar BE/SO (K.Eigenheer), 12.8. 1 ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon, H.Duperrex, L.Maumary).

Barge rousse: 3.9. 44 ind. Fanel BE (P.Lustenberger), très grand groupe, 7.9. 5 ind., 10./13./14.9. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs), 7.-12.9. 1 ind. Thun BE (M.Wettstein, M.Käppeli), 7./9./14.9. 1 ind. Rheindelta A (G.Sieber, P.Knaus, H.Klopfenstein, A.Täschler), 8.9. 1 ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon), 12.9. 1 ind. Uster ZH (M.Widmer).

Courlis corlieu: bon passage, à noter 1.8. 12 ind. Fanel BE (E.Bernardi). SOPM=54 ind. (moyenne¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=40 ind.).

Chevalier culblanc: passage en dessus de la moyenne, à noter 12.8. 15 ind. Illarsaz VS (R.Voisin), 14.8. 20 ind. Klingnauer Stausee AG (S.Stutz, W.Zanola). SOPM=615 ind. (moyenne¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=334 ind.).

Chevalier sylvain: passage en dessus de la moyenne, à noter 11.8. 138 ind. Nuolener Ried SZ (A.Täschler), nouveau record pour la Suisse, 12.8. env. 100 ind. Les Grangettes VD (J.-M.Duflon). SOPM=1392 ind. (moyenne¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=624 ind.).

Chevalier guignette: à noter 3.9. 70 ind. Préverenges VD (L.Maumary), très grand groupe.

Tournepièrre à collier: bon passage: mentions de 1-6 ind. en 17 carrés kilométriques. A noter 8.9. 1 ind. Cassonsgrat GR à 2700 m (photo: K.Mettler), l'espèce est très rare dans les Alpes. SOPM=16 ind. (moyenne¹⁹⁹²⁻²⁰⁰¹=12 ind.).

Labbe indéterminé: 7.7. 1 ind. Solothurn (P.Frara), 25.8. 1 ind. Léman VD (S.Antoniazza), 29.8. 1 ind. Champ-Pittet VD (F.Schneider), 1.9. 1 ind., 9.9. 6 ind. Chablais de Cudrefin VD (M.Schweizer, P.Rapin).



Schwarzkopfmöwe: Die Art wurde während der ganzen Berichtperiode regelmässig beobachtet, max. 14./17.8. 5 Ind. Genève (B.Piot, A.Bassin). Die SOPM zeigen eine steigende Tendenz: SOPM=75 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₁₉₉₆=24 Ind., Mittel₁₉₉₇₋₂₀₀₁=63 Ind.).

Zwergmöwe: Bisher ein eher schwacher Durchzug, SOPM=70 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=86 Ind.).

Heringsmöwe: U.a. 1.9. 29 Ind. Klingnauer Stausee AG (W.Portmann), 1.9. 12 Ind. Luzern (B.Volet).

Silbermöwe: 9.9. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (G.Viel).

Raubseeschwalbe: 15.6. 1 Ind. Leuzigen BE (W.Christen), 3. Meldung für die Aareebene, 23.7. 2 Ind. Môtier FR (R.Wagner), 3./5./16./18.8. und 14.9. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (D.Marques u.a.), 12.8. 1 Ind. Préverenges VD (H.Duperrex), 13.8. 1 Ind. Sempach LU (H.Schmid, M.Burkhardt), 13.8. 5 Ind., 26.8. 2 Ind., 5.9. 4 Ind., 9.9. 7 Ind., 12.9. 11 Ind. Rheindelta A (A.Täschler u.a.), 29.8. und 2./3.9. 3 Ind., 4.-8.9. 2 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beob.), 10.9. 1 Ind. Rapperswil SG (A.Täschler, K.Anderegg).

Brandseeschwalbe: 20.-22.6. 1 Ind. Sempach LU (B.Volet, M.Burkhardt, M.Alig), 10.7. 1 Ind. Kanderdelta BE (M.Wettstein), 10.7. 2 Ind., 11./14.7. 1 Ind., 12.8. 2 Ind. Préverenges VD (L.Vallotton, L.Maumary u.a.), 10.8. 2 Ind. Allaman VD (J.Duplain, E.Bernardi).

Zwergseeschwalbe: 22.6. 1 Ind. Sempach LU (M.Burkhardt), einzige Meldung!

Weissbartseeschwalbe: 3.7. 2 Ind. Sempach LU (M.Burkhardt), einzige Julifeststellung.

Bienenfresser: 15.6. 10 Ind. Kirchberg SG (H.Schönenberger), 30.6. 6 Ind. Filet VS (C.Katzenmaier), 17.7. ein Weibchen mit Brutfleck im Südtessin erschöpft gefunden (R.Lardelli), 14.8. 2 Ind. Kaltbrunnerriet SG (S.Röllin), 31.8. min. 2 Ind. Unterentfelden AG (A.Sutter).

Haubenlerche: 26.7. 1 Sänger St-Louis F, 3 km von der CH-Grenze entfernt (S.Keller), erste Meldung seit 1991.

Brachpieper: 29.6. und 1.7. 1 Sänger Zernez GR auf 2500 m ü.M. (R.Wüst). Erstmals ein Sänger in GR, zudem liegt die Beobachtung auf einer ungewöhnlichen Höhe. Die Art brütet in Spanien bis in Höhen von 2000 m ü.M.

Bergstelze: 25.6. 1 Paar füttert 5 Nestlinge Dischmatal/Davos GR auf 2070 m ü.M. (C.Koch), neuer Höhenrekord für eine Brut dieser Art.

Wasseramsel: U.a. 4.9. 1 Ind. Val Languard/Pontresina GR auf 2640 m ü.M. (B.+J.Meister), sehr hoch.

Rotsterniges Blaukehlchen: Insgesamt wurden im Tessin 7 Brutpaaree gefunden (A.Cereda, L.Jurietti, N.Zbinden)!

Blaukehlchen: Durchzugsmeldungen aus 24 Kilometerquadraten, ab 7.8. (1 Ind. Kaltbrunner Riet SG, H.Geisser).

Mouette mélanocéphale: l'espèce est régulièrement observée pendant toute la période considérée, max. 14./17.8. 5 ind. Genève (B.Piot, A.Bassin). Les SOPM montrent une tendance à l'augmentation: SOPM=75 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₁₉₉₆=24 ind., moyenne₁₉₉₇₋₂₀₀₁=63 ind.).

Mouette pygmée: passage plutôt modeste pour l'instant, SOPM=70 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=86 ind.).

Goéland brun: à noter 1.9. 29 ind. Klingnauer Stausee AG (W.Portmann), 1.9. 12 ind. Luzern (B.Volet).

Goéland argenté: 9.9. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (G.Viel).

Sterne caspienne: 15.6. 1 ind. Leuzigen BE (W.Christen), 3e mention pour la plaine de l'Aar, 23.7. 2 ind. Môtier FR (R.Wagner), 3./5./16./18.8. et 14.9. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (D.Marques et al.), 12.8. 1 ind. Préverenges VD (H.Duperrex), 13.8. 1 ind. Sempach LU (H.Schmid), 13.8. 5 ind., 26.8. 2 ind., 5.9. 4 ind., 9.9. 7 ind., 12.9. 11 ind. Rheindelta A (A.Täschler et al.), 29.8. et 2./3.9. 3 ind., 4.-8.9. 2 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs), 10.9. 1 ind. Rapperswil SG (A.Täschler, K.Anderegg).

Sterne caugek: 20.-22.6. 1 ind. Sempach LU (B.Volet, M.Burkhardt, M.Alig), 10.7. 1 ind. Kanderdelta BE (M.Wettstein), 10.7. 2 ind., 11./14.7. 1 ind., 12.8. 2 ind. Préverenges VD (L.Vallotton, L.Maumary et al.), 10.8. 2 ind. Allaman VD (J.Duplain, E.Bernardi).

Sterne naine: 22.6. 1 ind. Sempach LU (M.Burkhardt), unique mention !

Guifette moustac: 3.7. 2 ind. Sempach LU (M.Burkhardt), seule mention de juillet.

Guêpier d'Europe: 15.6. 10 ind. Kirchberg SG (H.Schönenberger), 30.6. 6 ind. Filet VS (C.Katzenmaier), 17.7. une femelle avec plaque incubatrice recueillie au sud du Tessin (R.Lardelli), 14.8. 2 ind. Kaltbrunnerriet SG (S.Röllin), 31.8. min. 2 ind. Unterentfelden AG (A.Sutter).

Cochevis huppé: 26.7. 1 ch. St-Louis F à 3 km de la frontière suisse (S.Keller), première donnée depuis 1991.

Pipit rousseline: à noter 29.6. et 1.7. 1 ch. Zernez GR, 2500 m (R.Wüst). Premier chanteur dans les Grisons à une alt. pour le moins inattendue pour un oiseau cantonné ; l'espèce niche toutefois jusqu'à 2000 m en Espagne.

Bergeronnette des ruisseaux: 25.6. 1 couple nourrit 5 juv. au nid Dischmatal/Davos GR, 2070 m (C.Koch), nouveau record d'altitude pour la nidification.


Cinle plongeur: à noter 4.9. 1 ind. Val Languard/Pontresina GR, 2640 m (B.+J.Meister), très haut.

Gorgebleue à miroir roux: 7 couples nicheurs finalement trouvés au Tessin (A.Cereda, L.Jurietti, N.Zbinden)!

Gorgebleue à miroir: passage noté en 24 carrés kilométriques, à partir du 7.8. (1 ind. Kaltbrunner Riet SG, H.Geisser).



Baumpieper: Wir vergleichen hier die Quadrate, für die bei den Atlasaufnahmen 1993–96 Nachweise gelangen (weisse Kreise) mit denjenigen, für die 1997–2002 ID- und MHB-Brutzeitnachweise vorliegen (schwarze Punkte; Beobachtungen ab Anfang Mai mit Atlascodes 2 oder 3). Es zeigt sich, dass das Areal in den Alpen und im Jura im Wesentlichen unverändert blieb, wenn man von vermutlichen Bearbeitungslücken absieht. Hingegen fallen im Mittelland, am Alpen- und Jurastrand sowie in der Nordschweiz die vielen unbestätigten Atlasquadrate auf: Ist die Art aus diesen Gebieten verschwunden oder sind es auch hier nur Bearbeitungslücken?



restés vides sur le Plateau, en bordure des Alpes et dans le nord du pays: l'espèce a-t-elle disparu de ces régions ou s'agit-il aussi d'un défaut de prospection? Les nouveaux points de Suisse centrale correspondent à des observations de début mai (code atlas 2 ou 3).

Hausrotschwanz: 28.7. 1 warnendes M Piz Sarsuret/Zernez GR auf 3120 m ü.M. (R.Schorta via H.Gehler), hoch.

Amsel: 19.6. 1 Sänger oberhalb Valchava GR auf 2180 m ü.M. (H.Gehler), nahe am Höhenrekord für einen Sänger.

Schilfrohrsänger: Nach der Feststellung eines Ind. am 17.7. bei Gland VD (M.-A.Berazategui) einsetzender Durchzug ab dem 1.8. (min. 2 Ind. Kalbrunner Riet SG, H.Geisser). Meldungen aus 26 Kilometerquadraten.

Drosselrohrsänger: U.a. erstmals eine Brut im Kanton JU bei Boécourt (J.-M.Gisiger).

Gelbspötter: 6.8. 1 Ind. Luzern (A.Borgula), 16.8. 1 Ind. Nuolener Ried SZ (K.+L.Felix), einzige Feststellungen nach der Brutzeit neben den Fängen in den Beringungsstationen von La Corbière/Autavaux FR (P.Monney, F.Banderet) und Bolle di Magadino TI (M.-A.Berazategui).

Orpheusspötter: Nur 2 Aug.-Beobachtungen: 2.8. 1 Ind. Martigny VS (B.Posse), 13.8. 1 Ind. Collex-Bossy GE (B.Piot).

Sperbergrasmücke: Reviere an zwei Orten in GR (H.Bolzern, A.Borgula, L.Juillerat, R.Wüst, M.Gerber).

Kleiber: U.a. 17.6. 1 Sänger Valchava GR auf 2170 m ü.M. (M.Hofer), hoch.

Beutelmeise: Beobachtungen ab 14.7. am Fanel BE (P.Rapin), 19.7. Ägelsee TG (W.Schmid), 20.7. Estavayer-le-Lac FR (P.Rapin), 4.8. Thuner Allmend BE (M.Wettstein); keine Bruthinweise.

Raubwürger: 15.9. 1 Ind. Ruggeller Ried FL (G.Sieber), erste Meldung.

Rotkopfwürger: Ausserhalb des Vorkommens in der Nordwestschweiz: 20.6. 1 Ind. Guttet VS auf 1620 m ü.M. (B.Bruderer), Höhenrekord in unserer Datenbank.

Pipit des arbres: la comparaison entre les carrés d'atlas occupés entre 1993 et 1996 (cercles blancs) et ceux où l'espèce a été observée entre 1997 et 2002 sans recherche spécifique (points noirs) montre que les aires alpine et jurassienne se maintiennent dans l'ensemble avec quelques lacunes probablement due à un manque de prospection. Il est par contre frappant de constater les carrés

restés vides sur le Plateau, en bordure des Alpes et dans le nord du pays: l'espèce a-t-elle disparu de ces régions ou s'agit-il aussi d'un défaut de prospection? Les nouveaux points de Suisse centrale correspondent à des observations de début mai (code atlas 2 ou 3).

Rougequeue noir: 28.7. 1 m. alarme au Piz Sarsuret/Zernez GR, 3120 m (R.Schorta via H.Gehler), haute altitude.

Merle noir: 19.6. 1 ch. au-dessus de Valchava GR, 2180 m (H.Gehler), proche du record d'altitude pour un chanteur.

Phragmite des joncs: après un ind. le 17.7. à Gland VD (M.-A.Berazategui), le passage débute le 1^{er} août (min. 2 ind. Kalbrunner Riet SG, H.Geisser) et se déroule en 26 carrés kilométriques.

Rousserolle turdoïde: à noter la première nidification dans le canton du Jura à Boécourt (J.-M.Gisiger).

Hypolais icterine: 6.8. 1 ind. Luzern (A.Borgula), 16.8. 1 ind. Nuolener Ried SZ (K.+L.Felix), seules données postnuptiales en dehors des stations de baguage de La Corbière/Autavaux FR (P.Monney, F.Banderet) et des Bolle di Magadino TI (M.-A.Berazategui).

Hypolais polyglotte: 2.8. 1 ind. Martigny VS (B.Posse), 13.8. 1 ind. Collex-Bossy GE (B.Piot), seules mentions d'août.

Fauvette épervière: deux sites occupés dans les Grisons (H.Bolzern, A.Borgula, L.Juillerat, R.Wüst, M.Gerber).

Sittelle torchepot: à noter 17.6. 1 ch. Valchava GR à 2170 m (M.Hofer), haute altitude.


Rémiz penduline: notée dès le 14.7. au Fanel BE (P.Rapin), le 19.7. à l'Ägelsee TG (W.Schmid), le 20.7. à Estavayer-le-Lac FR (P.Rapin) et le 4.8. au Thuner Allmend BE (M.Wettstein); pas d'indice de reproduction.

Pie-grièche grise: 15.9. 1 ind. Ruggeller Ried FL (G.Sieber), première donnée de la saison.

Pie-grièche à tête rousse: en dehors du nord-ouest du pays: 20.6. 1 ind. Guttet VS à 1620 m (B.Bruderer), record d'altitude pour notre banque de données.



Rohrschwirl: Beobachtungen 2002 aus den bekannten Gebieten (siehe Karte). Die Art wurde in den letzten drei Jahren im zentralen Mittelland (Aareebene BE/SO, der Wauwilerebene LU und dem Seetal AG/LU) praktisch nicht mehr festgestellt. Die letzte Meldung vom Häftli BE stammt aus 1994 (A. Stähli), von Grenchen SO von 1999 (W.Christen) und vom Wauwilermoos LU aus 1997 (R.Graf).



Locustelle lusciniöide: observations dans des sites classiques (voir carte). A noter que ces trois dernières années, l'espèce n'a plus été contactée au centre du Plateau, à une ou deux exceptions près, dans la plaine de l'Aar BE/SO, la plaine de Wauwil LU et le Seetal AG/LU. La dernière mention au Häftli BE remonte ainsi à 1994 (A.Stähli), vers Grenchen SO à 1999 (W.Christen), au Wauwilermoos LU à 1997 (R.Graf).

Tannenhäher: Zahlreiche Fänge auf den Beringungsstationen, vor allem seit Mitte August: Bisher 108 Fänglinge auf dem Col de Jaman VD (L.Maumary) und 99 Fänglinge auf dem Col de Bretolet VS (bisheriges Saisonmax.=61 Ind. 1997, M.Schaad, M.Kestenholz). Mehrere Beobachtungen an ungewöhnlichen Orten: U.a. 31.8. 2 Ind., 14.9. 6 Ind. Eschenbach LU (M.Thoma), 2.9. 1 Ind. Bolle di Magadino TI (M.-A.Berazategui), hier wahrscheinlich erstmals.

Erlenzeisig: Sehr wenige Beobachtungen in diesem Jahr, SOPM=21 Ind. (Mittel₁₉₉₂₋₂₀₀₁=116 Ind.).


Fichtenkreuzschnabel: Vor allem im August starke Invasionsbewegungen, die ausserhalb der Beringungsstationen nur schwer abzuschätzen sind. Auf dem Col de

Cassenoix moucheté: nombreuses captures dans les stations de baguage, surtout depuis mi-août : 108 ind. capturés jusqu'ici à Jaman VD (L.Maumary) et 99 ind. capturés à Bretolet VS (M.Schaad, M.Kestenholz, précédent max. saisonnier=61 ind. en 1997). Plusieurs observations dans des endroits inhabituels, p. ex. 31.8. 2 ind., 14.9. 6 ind. Eschenbach LU (M.Thoma), 2.9. 1 ind. Bolle di Magadino TI (M.-A.Berazategui), une probable première pour le site.

Tarin des aulnes: très peu d'observations cette année, SOPM=21 ind. (moyenne₁₉₉₂₋₂₀₀₁=116 ind.).

Bec-croisé des sapins: invasion notée surtout en août, difficile à quantifier hors station de baguage. Au col de Bretolet VS, 2116 ind. ont été capturés jusqu'ici, surtout

Zippammer: Wenn man die Verbreitung im Schweizer Brutvogelatlas 1993-96 (offene Kreise) mit den Quadraten vergleicht, für die zwischen 1997 und 2002 neue Nachweise vorliegen (schwarze Punkte), stellte man fest, dass die Vorkommen im Hauptverbreitungsgebiet (VS, TI, GR) weitgehend bestätigt sind. Einigen "neuen" Nachweisen (wo aber die Art teilweise im ersten Verbreitungsatlas schon nachgewiesen worden war...) stehen diverse unbestätigte Quadrate im Jura und entlang der Voralpen gegenüber. Diese Plätze sind nicht unbedingt verwaist, ist doch die Art in diesen Regionen nur ganz punktuell vorhanden und leicht zu übersehen. Eine kleine Anregung für die Brutsaison 2003?



Bruant fou: en comparant les carrés d'atlas occupés entre 1993 et 1996 (cercles blancs) avec les carrés où l'espèce a été observée entre 1997 et 2002 (points noirs), on constate que l'aire centrale est largement confirmée. On note plusieurs nouveaux contacts dans les Alpes (l'espèce avait été trouvée dans quelques-uns de ces « nouveaux » carrés lors du premier atlas) mais aussi de nombreux carrés vides dans le Jura et sur la frange nord des Alpes. Ces sites ne sont pas forcément abandonnés vu que l'espèce est très locale dans ces régions et peut donc passer facilement inaperçue en l'absence de recherche ciblée.



Bretolet VS wurden heuer bisher 2116 Ind. gefangen, dies vor allem in der zweiten Hälfte des August. Das bisherige Saisonmaximum lag bei 947 Fänglingen 1991 (M.Schaad, M.Kestenholz). Auf dem Col de Jaman VD, wurde mit bis jetzt 395 Ind. ebenfalls eine neue Höchstzahl gefangen (L.Maumary).

Karmingimpel: Neben den bereits im ID 241 erwähnten Orten: 6.6. 1 graues M Salgesch VS (J.Rey), 20.6. 1 graues M Bannriet SG (M.Widmer), 21.6. 1 Sänger Turbach BE (V.Althaus), 25.6. und 4.7. 1 Sänger zwischen Realp UR und Hospental UR (U.Glutz), 6./10.7. max. 3 Sänger Realp UR (K.Colombo, S.Trinkler).

Ortolan: Durchzug ab 12.8. (2 Ind. Nuolener Ried SZ, E.Grether), Meldungen aus 14 Kilometerquadraten.

Korrektur ID 241

Purpurreiher: les 6 ind. du 27.4. ont été vus aux Grangettes VD et non au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (J.-M.Duflon).

Informationen

Europäische Kormoranzählung

Die Arbeitsgruppe Kormoran von *Wetlands International* organisiert die erste koordinierte europäische Zählung von Kormoranen an ihren Winterschlafplätzen. Sie findet statt am Wochenende der internationalen Wasservogelzählung vom 12. Januar 2003. Für die Zählung der grossen bekannten Schlafplätze werden wir die Zähler, die bereits früher Schlafplatzzählungen durchgeführt haben, direkt kontaktieren. Wir sind aber auch interessiert an Zahlen für kleine, eventuell nicht bekannte Schlafplätze. Gezählt wird am Abend oder in der Morgendämmerung.

Die Wasservogelzähler erhalten im Oktober Protokollformulare mit den Zählunterlagen. Übrige ID-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter können Formulare bei uns oder auf der Webseite der Vogelwarte beziehen oder die Daten über den ID melden. Bitte bezeichnen Sie die Meldung klar als Schlafplatzzählung.

Gesucht

Für die mauretanischen Mitarbeiter im Sahara-Projekt suchen wir noch nicht mehr gebrauchte Feldstecher, Fernrohre und Stative.

Kontakt: Barbara Trösch oder Dieter Peter, Schweizerische Vogelwarte, 6204 Sempach, Tel.: 041 462 9784 oder 041 462 9746, e-mail: barbara.troesch@vogelwarte.ch

Wettbewerb: neue Kilometerquadrate

Für 560 Kilometerquadrate liegen von 2002 erstmals Meldungen vor. Zwei Personen führen die Rangliste mit 82 bzw 47 neuen Quadraten an. Wer bietet mehr? Es bleiben noch einige Monate, um Plätze gut zu machen...

dans la seconde moitié du mois d'aôut ; le précédent record saisonnier était de 947 oiseaux en 1991 (M.Schaad, M.Kestenholz). Au col de Jaman VD, chiffre record également de 395 ind. capturés jusqu'à maintenant (L.Maumary).

Roselin cramoisi: en plus des sites déjà mentionnés dans le bulletin 241: 6.6. 1 m. gris Salgesch VS (J.Rey), 20.6. 1 m. gris Bannriet SG (M.Widmer), 21.6. 1 ch. Turbach BE (V.Althaus), 25.6. et 4.7. 1 ch. entre Realp UR et Hospental UR (U.Glutz), 6./10.7. max. 3 ch. Realp UR (K.Colombo, S.Trinkler).

Bruant ortolan: passage débutant le 12.8. (2 ind. Nuolener Ried SZ, E.Grether), noté jusqu'ici en 14 carrés kilométriques.

Correction SI 241

Héron pourpré: les 6 ind. du 27.4. ont été vus aux Grangettes VD et non au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (J.-M.Duflon).

Informations

Recensement européen des Grands Cormorans

Le groupe de travail « Cormoran » de *Wetlands International* organise le premier recensement coordonné des Grands Cormorans aux dortoirs hivernaux. Il se déroulera pendant le week-end de recensement du 12 janvier 2003. Pour organiser les comptages des grands dortoirs connus, nous prendrons directement contact avec les personnes qui y ont déjà fait des recensements dans le passé. Nous aimerions cependant aussi obtenir les chiffres des petits dortoirs, éventuellement encore inconnus. Les comptages se dérouleront le soir ou à l'aube.

Les recenseurs recevront les formulaires ad hoc en octobre. Les personnes qui ne participent normalement pas aux recensements peuvent nous demander les formulaires ou les télécharger depuis notre site Internet. Si vous transmettez les informations via le Service d'information (fiche SI ou IDEXT), veuillez clairement indiquer dans les remarques qu'il s'agit d'un recensement au dortoir.

On recherche

Dans le cadre du projet « Sahara », nous cherchons des jumelles, télescopes et trépieds inutilisés pour équiper nos collaborateurs mauritaniens.

Contact: Barbara Trösch ou Dieter Peter, Station ornithologique suisse, 6204 Sempach, Tél.: 041 462 9784 ou 041 462 9746, e-mail: barbara.troesch@vogelwarte.ch

Concours: nouveaux carrés 2002

560 carrés kilométriques helvétiques ont fourni des données pour la première fois en 2002. Deux personnes dominent nettement le palmarès avec resp. 82 et 47 nouveaux carrés intégrés en 2002. Il reste encore quelques mois pour battre ces records. Qui dit mieux?



IDEXT

Seit Juni 2002 haben wir mehr als 330 Installations-CD für die neue Version des IDEXT-Programmes verschickt. In einigen wenigen Fällen trat bei der Installation ein Problem auf, das wir mittlerweile lösen konnten. Falls Sie im Betrieb des Programms Fehler festgestellt haben, bitten wie Sie, mit uns Kontakt auf zu nehmen, damit wir allfällige Probleme beheben können. Wenn Sie das Erfassungsprogramm noch nicht installiert haben, zögern Sie nicht länger, eine CD zu bestellen. Die Version für MacIntosh ist immer noch in Bearbeitung. Wir bedanken uns bei allen Mac-Benutzern für die Geduld.

Gänsesäger

Wir möchten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten, uns Federn von Gänsesägern für unsere genetische Studie (siehe ID 240) baldmöglichst zu schicken. Wir können auch den alten Nestinhalt mit den Dunenfedern des Weibchens (und eventuell Eischalenreste) verwenden. Kontrollieren Sie deshalb die Ihnen zugänglichen Nisthöhlen. Eine Anleitung zum Sammeln und Lagern ist bei der Vogelwarte oder vom Internet (www.vogelwarte.ch unter "Mitarbeit" - "Gänsesäger") erhältlich.

Gebäudebruten von Felsenschwalben

U. Glutz von Blotzheim (Herrengasse 56, 6430 Schwyz) hat in den letzten Jahren vor allem das Oberwallis planmässig nach Gebäudebruten von Felsenschwalben abgesehen (Ökologie der Vögel 24, 2002, 683-701). In diesem Jahr ist die Nachsuche vor allem mit Hilfe von B. Posse auch im Unterwallis intensiviert worden. Es konnten insgesamt mehr als 70 Gebäudebrüter-Paare festgestellt werden. Die Ergebnisse sollen in einem der nächsten Hefte von *Nos Oiseaux* publiziert werden. Um diese Darstellung möglichst lückenlos auf den derzeitigen Kenntnisstand zu bringen, wäre U. Glutz dankbar für die Mitteilung aller bisher noch nicht gemeldeten Gebäudebruten. Es ist anzunehmen, dass mit dieser Hilfe in mehreren Fällen vor allem das Jahr der Erstansiedlung an Gebäuden noch präzisiert werden kann. Lücken gibt es am ehesten noch in weitläufigen und/oder hoch gelegenen Orten.

Folgenden Angaben sind hilfreich: Beobachtungsdatum, Gemeinde, Bezeichnung des Hauses (Name des Hauses, Eigentümers oder Bewohners), genaue Koordinaten. Beschreibung des Hauses (Mauerwerk, Massivholzbau, Holzverschalung, Anzahl Stockwerke, Höhe des Hauses). Neststandort (auf Firstbalken, nur angeklebt, an Dachsparren, an Mauerwerk, Holzverkleidung usw. oder zusätzlich gestützt durch..., Exposition der entsprechenden Fassade, Exposition des Nestes), Baujahr des Gebäudes, Jahr der Erstansiedlung der Felsenschwalbe an diesem Gebäude, Bemerkungen (ad. brütet, hudert, füttern 5 Nestlinge, altes Nest derzeit nicht besetzt usw.), Beobachter (mit Adresse). Besten Dank für die Mitarbeit!

Europäischer Brutvogelatlas

Wir haben noch etliche Exemplare des 1997 erschienen europäischen Brutvogelatlas des EBCC (engl. mit dt. Zus.fassg.). Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir ihn jetzt zum Spezialpreis von Fr. 75.- (statt 125.-) an.



Atlas européen EBCC

Nous avons encore un certain nombre d'exemplaires de l'atlas européen EBCC (paru en 1997) à disposition pour tous les intéressés. Ils peuvent être commandés à la Station ornithologique au prix de Fr.75.- au lieu de Fr. 125.-

IDEXT

Depuis juin 2002, nous avons distribué plus de 330 disques d'installation de la nouvelle version du programme IDEXT. Un seul problème d'installation nous a été signalé trois ou quatre fois et a pu être résolu. Si vous avez rencontré des difficultés lors de l'installation de la nouvelle version, nous vous sommes reconnaissants de nous le dire pour que nous puissions tenter de les résoudre. Si vous avez un PC mais pas encore le programme de saisie IDEXT, n'attendez plus pour nous le demander ! La version pour MacIntosh est encore en préparation. Merci aux utilisateurs de Mac pour leur patience.

Harle bièvre

Dans le cadre de notre étude génétique, nous vous serions reconnaissants de nous envoyer les plumes de Harles bièvres le plus vite possible (voir bulletin SI 240). Nous pouvons également travailler avec le contenu de nids utilisés: duvet de la femelle voire restes de coquilles d'œufs. Merci de contrôler les cavités de nidifications qui sont à votre portée! Nous vous envoyons volontiers les instructions sur la façon de récolter et stocker les échantillons.

Nichées d'Hirondelles de rochers sur bâtiments

Ces dernières années, U. Glutz von Blotzheim (Herrengasse 56, 6430 Schwyz) a recherché systématiquement les nids d'Hirondelles de rochers sur bâtiment dans le Haut-Valais (Ökologie der Vögel 24, 2002, 683-701). La recherche s'est intensifiée cette année en Bas-Valais, grâce notamment à l'aide de B. Posse. Plus de 70 couples nicheurs sur bâtiment ont été trouvés. Les résultats seront publiés prochainement dans *Nos Oiseaux*. Afin d'obtenir une image aussi complète que possible, U. Glutz serait heureux de connaître toute nichée sur bâtiment qui n'aurait pas encore été signalée. Il devrait être ainsi également possible de préciser en quelle année le bâtiment a été colonisé. Les lacunes concernent à priori les localités éloignées ou haut situées.

Les informations suivantes sont souhaitées: date d'observation, commune, identification de la maison (nom de la maison, du propriétaire ou du locataire), coordonnées précises, description de la maison (construction en pierre, en bois, revêtement de bois, nombre d'étages, hauteur de la maison), site du nid (sur poutre faîtière, seulement collé au chevron, sur la maçonnerie, sur le revêtement en bois, etc. ou soutenu par ..., exposition de la façade concernée, exposition du nid), année de construction du bâtiment, année de colonisation par l'Hirondelle de rochers, remarques (ad. couve, nourrit 5 jeunes au nid, vieux nid abandonné, etc.), observateur (avec adresse). D'avance merci beaucoup!



Mitteilung der Schweiz. avifaunistischen Kommission (SAK)

Communication de la Commission de l'avifaune suisse (CAvS)

Nachfolgend die aktuellen Seltenheitsbeobachtungen, für welche Beobachtungsprotokolle vorliegen. Alle aufgeführten Fälle sind hängig (Ausnahme: mit * bezeichnete sind bereits angenommen) und mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren. Die Entscheide der Kommission werden alljährlich im Ornithologischen Beobachter und in Nos Oiseaux publiziert. Die neusten Entscheide sind jeweils im Internet abrufbar: www.vogelwarte.ch/sak_d.html.

Um den administrativen Aufwand zu reduzieren, verzichtet die SAK ab sofort darauf, den Eingang der Protokolle zu bestätigen. Hingegen werden die Beobachter nach wie vor persönlich über die Entscheide der Kommission informiert.

Observations d'oiseaux rares, pour autant qu'un protocole soit disponible. Ces cas n'ont pas encore été homologués (exception: les données suivies d'un * ont déjà été acceptées) et doivent donc être traités avec les précautions habituelles. Les décisions de la commission sont publiées chaque année dans Nos Oiseaux et Der Ornithologique Beobachter. Les décisions les plus récentes peuvent aussi être consultées sur le site Internet www.vogelwarte.ch/sak_f.html.

Afin de réduire le travail administratif, la CAvS n'accuse plus réception des rapports qu'elle reçoit. Les observateurs sont néanmoins toujours avisés personnellement des décisions prises.

Eingereichte Protokolle / protocoles reçus

Ohrentaucher/Grèbe esclavon: Greifensee ZH, 30.6.–26.8., ad. ● Sursee LU, 9.8.

Basstölpel/Fou de Bassan: Birri AG, 29.3., ad.

Rosapelikan/Pélican blanc: Bolle di Magadino TI, 14.–15.9.

Rohrdommel/Butor étoilé: Klingnauer Stausee AG, 21.7.

Rosaflamingo/Flamant rose: Chablais de Cudrefin VD, 31.8.–14.9., ad. beringt/*bagué* DCJT.

Schwarzkopfruderente/Erismature rousse: Kesswil TG, 13.1., Weibchen ● Les Grangettes VD, 3.2., M.

Mönchsgeier/Vautour moine: Col de Bretolet VS, 8.9.

Schlangenadler/Circaète Jean-le-Blanc: Zürich ZH, 21.5. ● Engelberg OW, 23.6. ● Ollon VD, 10.7. ● Äbnet/Attinghausen UR, 22./27.7. ● Sant'Antonio TI, 17.8., 1.KJ/1^{re} a.c.

Zwergadler/Aigle botté: Fanel BE, 25.5., dunkle *Morphelmorphe sombre*.

Weissbürzelstrandläufer/Bécasseau de Bonaparte: Fanel NE/Chablais de Cudrefin VD, 5.8., ad.

Sumpfläufer/Bécasseau falcinelle: Nuolener Ried SZ, 12.8., ad.

Odinshühnchen/Phalarope à bec étroit: Collonge-Bellerive GE, 25.8. ● Chavornay VD, 3.9., 1.KJ.

Falkenraubmöwe/Labbe à longue queue: Kühlewil BE, 30.8. 1.KJ/1^{re} a.c. ● Serrières NE, 31.8., 1.KJ ● Lac de Moiry/Grimentz VS, 7.9., 1.KJ ● 9.9. Sempach LU, 1.KJ.

Skua/Grand Labbe: Les Grangettes VD, 2.6.

Mantelmöwe/Goéland marin: Zug ZG, 13.1., 3 Ind.

Lachseeschwalbe/Sterne hansel: Préverenges VD, 3.5., ad.

Zwergohreule/Petit-duc scops: Lachen SZ, 10.4., ad. ● Felsberg GR; 15.5., rufend/*chanteur* ● Bardonnex GE, 14./19.6., rufend ● Scuol GR, 22.6., rufend.

Blauracke/Rollier d'Europe: Gudo TI, 28.–30.5., ad.

Rötelschwalbe/Hirondelle rousseline: Les Grangettes VD, 4.5., ad.

Zitronenstelze/Bergeronnette citrine: Lachen SZ, 24.5., M ad.

Cistensänger/Cisticole des joncs: Kaltbrunner Riet SG, 22.8.–1.9., singend/*chanteur*.

Schlagschwirl/Locustelle fluviatile: Boniswiler Ried AG, 1.6.–14.7., singend/*chanteur*.

Seggenrohrsänger/Phragmite aquatique: Fanel BE, 5.8.

Weissbartgrasmücke/Fauvette passerinette: Leuk VS, 15.4., M ● Malans GR, 5.–6.5., M.

Samtkopfgasmücke/Fauvette mélanocéphale: Bolle di Magadino TI, 4./8.4., W.

Kappenammer/Bruant mélanocéphale: Dötra/Olivone TI, 27.6., M.