



Commission de l'avifaune suisse (CAvS)

Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2003

13^e rapport de la Commission de l'avifaune suisse

Georges PREISWERK

Version française: Lionel MAUMARY

En 2003, la Commission de l'avifaune suisse (CAvS) a examiné 182 cas concernant 80 espèces, dont 84 % ont été homologués. Parmi les événements les plus marquants figurent la première donnée du Pluvier fauve *Pluvialis fulva* et la première nidification du Gobemouche nain *Ficedula parva* en Suisse. Il faut leur ajouter: la 4^e visite du même Flamant rose *Phoenicopterus ruber* au Chablais de Cudrefin VD; l'expansion du Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos*, avec 5 nidifications qui confirment l'établissement de l'espèce en Suisse orientale; la 4^e donnée de Fou de Bassan *Sula bassana* (séjour de plus de 10 jours sur le Léman, après la 1^{re} donnée de 1998; la 3^e donnée de l'Elanion blanc *Elanus caeruleus*; la 4^e de l'Aigle pomarin *Aquila pomarina* (dernière en 1986). A noter également les deux premières observations homologuées d'Aigle botté *Hieraetus pennatus* de morphe sombre (dont une en 2002) et le premier hivernage d'un Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*. Avec 5 observations, le plus fort afflux de Bécasseaux tachetés *Calidris melanotos* a été enregistré. Le bas niveau des eaux, dû à la canicule estivale, a peut-être contribué à cette fréquence inhabituelle.

A fin 2003, la liste suisse compte 390 espèces en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et C (oiseaux introduits), dont 383 ont été observées depuis 1900; 7 espèces demeurent en catégorie D (oiseaux d'origine douteuse).

En 2003, la Commission de l'avifaune suisse (CAvS) a examiné 182 cas (106 de Suisse allemande, 69 de Romandie et 7 du Tessin), concernant 80 espèces; 152 d'entre eux, concernant 69 espèces, ont été homologués (84%); 27 cas concernent des années antérieures. Il y a encore 12 autres cas en suspens. A fin 2003, la liste suisse compte 390 espèces en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et C (oiseaux introduits), dont 383 ont été observées depuis 1900; 7 espèces demeurent en catégorie D (oiseaux d'origine douteuse).

La CAvS a travaillé en collaboration avec la Commission avifaunistique du lac de Constance (AKB), créée à fin 2001. Tous les cas provenant de la rive suisse de ce lac ont été traités par l'AKB et transmis pour confirmation à la CAvS.

La liste des espèces soumises à homologation et les formulaires de description peuvent être téléchargés sur le site Internet

www.vogelwarte.ch/sak_f.html. La page d'accueil de l'Association of European Rarities Committees (AERC): www.aerc.be contient les adresses de toutes les commissions avifaunistiques européennes, les directives et d'autres informations.

En 2003, la CAvS était composée de Michel Baudraz, Steffen Gysel, Peter Knaus, Lionel Maumary, Georges Preiswerk et Manuel Schweizer. Le secrétariat était assuré par Bernard Volet.

Présentation des données – Les espèces sont ordonnées systématiquement selon la liste des oiseaux de la Suisse (VOLET *et al.* 2000). Lorsque l'espèce n'est que partiellement soumise à homologation, les conditions sont indiquées après le nom scientifique. Pour les autres espèces, les trois doubles chiffres entre parenthèses donnent: 1) la récapitulation du nombre de cas/individus en Suisse entre 1900 et 1991 lorsqu'il est connu (« + » si le nombre exact est inconnu); 2) le nombre de

cas/individus depuis 1992, année d'entrée en vigueur de la première liste révisée des espèces soumises à homologation (UNDELAND *et al.* 1993) mais sans les données de 2003; 3) le nombre de cas/individus en 2003. Les données se suivent dans l'ordre alphabétique des abréviations des cantons, puis dans l'ordre chronologique. Les abréviations officielles utilisées sont: AG = Argovie; AI = Appenzell Rhodes-Intérieures; AR = Appenzell Rhodes-Extérieures; BE = Berne; BL = Bâle-Campagne; BS = Bâle-Ville; FR = Fribourg; GE = Genève; GL = Glaris; GR = Grisons; JU = Jura; LU = Lucerne; NE = Neuchâtel; NW = Nidwald; OW = Obwald; SG = Saint-Gall; SH = Schaffhouse; SO = Soleure; SZ = Schwytz; TG = Thurgovie; TI = Tessin; UR = Uri; VD = Vaud; VS = Valais; ZG = Zoug; ZH = Zurich. La région du Fanel étant située à l'intersection de BE, FR, NE et VD, cette localité peut figurer dans l'un ou plusieurs de ces quatre cantons limitrophes suivant le site effectif d'observation. Après l'abréviation officielle du nom du canton, les informations suivantes sont indiquées: localité ou commune, date(s), effectif (un individu si rien n'est précisé), sexe et âge et toute autre précision sur les circonstances de la découverte ou l'existence de preuve, observateur(s). Lorsque le nombre d'observateurs dépasse cinq, seul le(s) nom(s) du/des découvreur(s) est/sont cité(s) en toutes lettres. Un cas correspond généralement à une observation mais lorsque plusieurs observations concernent certainement le(s) même(s) individu(s), celles-ci sont regroupées sous un seul cas. Le signe « • » sépare des cas différents. Les séjours qui se prolongent au-delà de la fin d'une année ne sont comptabilisés que pour cette année.

Abréviations – ind. = individu; ad. = adulte; subad. = subadulte; imm. = immature; juv. = juvénile; 1 a. c., = « de 1^{re} année civile », c'est-à-dire dans son année de naissance jusqu'au 31 décembre; 2 a. c. = « de 2^e année civile » et ainsi de suite; f. = femelle; m. = mâle; enr. = enregistré acoustique; capt. = capture; phot. = photographie.

Observations homologuées en 2003 (avec compléments)

Catégorie A

Plongeon imbrin *Gavia immer* (+, 51/55, 6/6)

FR – Forel, 27 février–9 mars (P. Rapin, M. Spiess, N. Philo, J. Duplain).
– entre Forel et Estavayer-le-Lac, 14-15

novembre, 1 ind.; 16 novembre-8 décembre, jusqu'à 2 ind.; 11 décembre, 1 ind. (P. Rapin, J. Jeanmonod, M. Cantin).

TG – Lac de Constance, entre Uttwil et Güttingen, 25 avril-2 mai, ad. (H. & G. Edelmann, W. Christen, H. Leuzinger).

VD – Yvonand, 16-17 novembre (S. Antoniazza, J.-M. Duflon).

ZH – Greifensee/Schwarzenbach, 3-4 juin, ad., phot. (P. J. Brändli, H.-U. Dössegger, S. Kohl).

Outre les observations traditionnelles des lacs de Neuchâtel et de Constance, celle de juin au Greifensee est très inhabituelle.

Fou de Bassan *Sula bassana* (0, 3/3, 1/1)

VD – Léman, entre Allaman et Excenevex F74, 1^{er}-13 février, ad., phot. in *Nos Oiseaux* 50: 136, 2003, in *Ornis* 2/03: 26, in *Ornithos* 10: 125, 2003, in *Limicola* 17: 91, 2003 et in *Dutch Birding* 25: 131, 2003 (R. Jordan *et al.*).

Après les observations de juin 1998, 2000 et 2001 (PREISWERK 1999; POSSE 2001; MAUMARY 2002), il s'agit du premier séjour hivernal sur une période plus longue. Le ventre légèrement mazouté de l'oiseau indique qu'il provenait probablement du golfe de Gascogne, où a eu lieu le naufrage du « Prestige » à cette période. Contrairement aux premiers Fous de Bassan observés en Suisse, cet individu semblait « à l'aise » sur le lac et plongeait pour se nourrir.

Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmaeus* (0, 6/10, 1/1)

SZ – Freienbach SZ, 12 janvier-16 février, ad. (E. Grether, K. & L. Felix *et al.*); peut-être le même hivernant qu'en 2001-2002.

TG – Complément: 19 mai 2001-22 janvier 2003: lac Inférieur, surtout au Wollmatinger Ried D, à la Radolzfeller Aachmündung D et la Hornspitze D, parfois dans le bassin d'Ermatingen sur territoire suisse, ad., probablement tiré le 1^{er} février 2003 à la Hornspitze D (M. Basen, I. Weiss, R. Sokolowski, B. Porer *et al.*).

L'hivernant du lac Inférieur a apparemment été victime de la méprise d'un chasseur de cormorans...

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (juin et juillet)

AG – Flachsee Unterlunkhofen, 19 juillet (J. Hartmann, T. Stahel, A. Huber).

VD – Les Grangettes, 15 juillet (J.-M. Fivat, O. Epars, J.-C. Monney *et al.*).

Deux observations hâtives, qui ne permettent cependant pas de suspecter une nidification.

Flamant rose *Phoenicopterus ruber* (2/64, 4/7, 1/11)

VD – Chablais de Cudrefin, 15-17 septembre, 1 ad. bagué en couleur DCJT et 10 ind. 1 a. c., phot. (J.-L. Zimmermann, F. Turrian *et al.*).

Il s'agit du 4^e séjour en Suisse de cet oiseau bague, cette fois avec 10 jeunes de l'année et pour 3 jours seulement! Cet oiseau est apparu en Suisse pour la première fois en 1998, puis a visité le Chablais de Cudrefin chaque année depuis 2001 (MAUMARY 2002; SCHWEIZER & MAUMARY 2003). Le 15 août, soit exactement un mois avant son arrivée en Suisse, il avait été observé au Sebkheth Sejoumi près de Tunis (Tunisie), plus de 1100 km au sud du Chablais de Cudrefin (C. Germain *in litt.*)! L'observation de 1992 (K. Eigenheer, T. Guillaume *et al.*, *in* MOSIMANN & MAUMARY 1993) a été rétroactivement placée en catégorie A.

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* (hors de la retenue de Klingnau et du lac de Constance)
TG – Baggerweiher Erzenholz/Frauenfeld, 7 novembre, 5 ad., phot. (H. Leuzinger, W. Geiger, W. Greminger).

Comme l'année précédente (SCHWEIZER & MAUMARY 2003), cet étang a été visité à nouveau en 2003. Ce site n'est éloigné que de 30 km du bassin d'Ermatingen TG/D au lac Inférieur, où l'espèce hiverne presque chaque année.

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (5/13, 1/3, 1/3)

BE/VD – Hagneck, 7 novembre, 3 ind. (T. Marbot); Chevroux, 15 novembre 2003-18 janvier 2004, 1 ad. et 2 ind. 1 a. c. puis 2 a. c., phot. *in* Nos Oiseaux 51: 50, 2004 (F. Schneider *et al.*); Fanel/Chablais de Cudrefin, 22 janvier-16 mai 2004, 1 ad. et 2 ind. 2 a. c., phot. (M. Thoma, J. Weber, P. Wiprächtiger, M. Zimmerli *et al.*).

Ces 3 individus ont été considérés comme sauvages et donc placés en catégorie A. Il est impossible d'être absolument certain que les oiseaux d'eau ne soient issus de captivité, à moins qu'une bague (généralement de couleur) ou des ailes rognées n'indiquent une telle origine. Les oiseaux d'eau sauvages sont plutôt farouches mais dans les endroits où ils sont nourris, ils peuvent se rapprocher des hommes et se laisser apprivoiser rapidement.

Bernache cravant *Branta bernicla* (12/28, 10/16, 1/1)

BS/BL – Bâle et Birsfelden, 16 février, 2 a. c. présentant les caractères de la sous-espèce *Branta bernicla bernicla*, phot. (G. Preiswerk).

Même remarque que pour l'espèce précédente.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* (15/9, 5/5, 1/1)

TG – Kesswil, 22 et 24 décembre 2003, puis 7, 8 et 19 janvier 2004, m. ad., phot. (P. Willi, M. Thoma, M. Gerber, G. Juen).

VD – *Complément*: Les Grangettes, 4 mai 2002, m., phot. (J. Duplain, I. & F. Henry, S. & D. Progin *et al.*).

Originnaire d'Amérique du Nord, ce canard hiverne principalement du sud des Etats-Unis à l'Amérique centrale. Quelques individus s'égarer chaque année jusqu'en Europe, surtout dans les îles Britanniques.

Elanion blanc *Elanus caeruleus* (1/1, 1/1, 1/1)

ZH – Altikon, 15-16 juillet (A. Widmer, F. Meyer). Il ne s'agit que de la 3^e donnée suisse.

Milan noir *Milvus migrans* (décembre et janvier)

NE – Serrières, 22 janvier (Ö. Akeret).

A nouveau une observation hivernale. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un retour précoce (voir SCHWEIZER & MAUMARY 2003).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* (+, 22/22, 1/1)

BE – *Complément*: entre Wohlensee et Niederriedstaensee, 3 décembre 2001-16 février 2002, 1 a. c., puis 2 a. c., phot. *in* Ornithologie 1/02: 26 et *in* Limicola 16: 105, 2002 (C.-L. Suter Thalmann *et al.*); *in* MAUMARY (2002), la date du 11 février 2002 avait été citée comme étant la dernière.

SZ – îles Ufenau et Lützelau, 13-22 février, imm., phot. (A. Täschler, C. Koller *et al.*).

TG – *Complément*: Eschenz, 24 novembre 2002, imm. (S. Trösch).



G. Preiswerk

Bernache cravant *Branta bernicla* 2 a. c. présentant les caractères de *Br. b. bernicla*. Bâle, Birsfelder Stau BS, 16 février 2003.

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus*
(11/11, 6/6, 1/1)

VD – Chardonne, 20 mars, ad. (A. Eray).

Dans le contexte helvétique, il s'agit d'une donnée très hâtive car les dernières données depuis 1989 ont toutes eu lieu à fin mai ou début juin. Les premiers retours dans le sud de la France ont lieu déjà à début mars, le gros arrivant dans la seconde moitié de ce mois. (GLUTZ VON BLOTZHEIM *et al.* 1971).

Vautour fauve *Gyps fulvus* (15/18, 23/39, 7/13)

BE – Gurten, 13 avril, phot. (P. Lustenberger, M. Zimmerli, S. Bachmann).

– Sieben Hengste/Habkern, 15 juillet, 5 ind., phot. (E. Jörg, P. Augustin).

FR – Tsuatsaux/Neirivue, 18 mai (P. & E. Beaud).

UR – Eggbergen/Altdorf, 15 juillet, 3 ind. (H. Die-thelm, E. Stieger).

VS – Champéry, 10 mai, phot. (D. Querio).

– Moosfluh/Greich, 30 mai (C. Marti *et al.*);
Getwing/Bratsch, 30 mai (G. Sieber,
P. Oggier *et al.*).

– Gärstenhörner/Oberwald, 29 juin, phot. (M. Ruffieux, D. Helfenstein, K. Fischer, A. Schenker).

Observations à nouveau nombreuses.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*
(novembre à février, hors Valais toute l'année)

GR – *Complément*: Stampa, 28 septembre-2 octobre 1994 (R. & D. Maurizio).

TI – Sant'Antonio, 24 et 30 août, 2 ind. (P. Ricceri, M. Salvioni).

VD – Bex, 20 juillet (N. Jordan).

Comme l'année précédente, une observation dans le même site tessinois.

Busard pâle *Circus macrourus* (13/13, 5/5, 5/5)

BE – Gurten, 1^{er} septembre, m. ad. (P. Lustenberger).

FR – Ostende/Gletterens, 12 avril, 2 a. c., phot. *in Nos Oiseaux* 50: 136, 2003 (L. Maumary, D. Saluz, J. Bruezière).

SO – Grenchen, 12 avril, m. 3 a. c. (W. Christen).

VD – Chablais de Cudrefin, 26 avril, m. ad. (P. Lustenberger, M. Zimmerli).

– Grandcour, 27 septembre, m. ad. (P. & M.-C. Rapin).

VS – *Complément*: Gampel, 13 avril 2002, m. (H. Duperrex).

Afflux exceptionnel en 2003.

Buse pattue *Buteo lagopus* (+, 19/19, 3/3)

AG – Hägglingen, 13 janvier, f. ad. (C. Suter).

LU – Altishofen, 12 février, 2 a. c., recueillie affaiblie, morte le 20 février, phot.; conservée au Naturhistorischen Museum de Bâle (R. Fel-der, N. Zbinden).

SZ – Nuolener Ried, 24 février, m. ad. (L. Hüppin).

Aigle pomarin *Aquila pomarina* (3/3, 0, 1/1)

BE – Gurten, 16 mai, min. 3 a. c. (P. Lustenberger).

Il s'agit de la première observation depuis 1986. Cette espèce niche en Europe de l'Est et migre vers le sud-est pour hiverner en Afrique orientale, ce qui explique la rareté des mentions dans notre pays (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1971).

Aigle criard *Aquila clanga* (19/19, 15/8, 1/1)

BE – retenue de Niederried, 14 décembre 2003-11 janvier 2004, ad., phot. (A. Meyer, G. Rochat *et al.*).

Il s'agit du 9^e hivernage d'affilée du même individu. Etant donné la longévité potentielle de plus de 20 ans, on peut espérer que cet oiseau reviendra encore de nombreux hivers!

Aigle criard ou **A. pomarin**

Aquila clanga ou *A. pomarina*
(1/1, 3/3, 0)

GR – *Complément*: Vicosoprano, 3 novembre 1984 (R. Maurizio).

La date tardive plaide plutôt en faveur d'un Aigle criard.

Aigle botté *Hieraaetus pennatus*
(11/11, 15/15, 1/1)

BE – Bargaen, 4 mai, morphe sombre (P. Lustenberger).

– *Complément*: Gurten, 17 août 2002, morphe sombre (P. Lustenberger).

Il s'agit des premières données



D. Helfenstein

Vautour fauve *Gyps fulvus*. Oberwald VS, 29 juin 2003. Photo prise depuis un parapente à environ 3600 m d'altitude.

homologuées en Suisse d'Aigle botté de morphé sombre, les observations antérieures étant insuffisamment documentées.

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* (0, 0, 1/1)

VD – Prévèrenge, 21 juillet, m. ad., phot. in *Nos Oiseaux* 50: 202, 2003, in *Limicola* 17: 211, 2003, et in *Ornis* 5/03: 26 (L. Maumary et al.).

Il s'agit de la première donnée suisse de cette espèce nichant de la Sibérie septentrionale à l'ouest de l'Alaska et hivernant de la Somalie aux îles du Pacifique. Le Pluvier fauve, capable de vols sans escale de plus de 4000 km, apparaît assez régulièrement en Europe lors de ses lointaines pérégrinations.

Vanneau sociable *Chettusia gregaria* (4/4, 8/8, 1/1)
BE/FR – Grosses Moos, 13-20 mars, phot. in *Ornis* 3/03: 26, in *Limicola* 17: 93, 2003 et in *Dutch Birding* 25: 258, 2003 (P. Mosimann-Kampe et al.).

Cette espèce, extrêmement menacée, est apparue dans cette région chaque année depuis 2000.

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* (13/13, 7/7, 5/5)

BE – Thuner Allmend, 20 septembre, 1 a. c. (M. Wettstein).

TG – Egnach, 2 et 6 octobre, 1 a. c., phot. (P. Frei, D. Bruderer, P. Willi).

VD – Chablais de Cudrefin, 16 août, 1 a. c. (S. Stutz, W. Zanola) • 9 septembre, 1 a. c., phot. (P. Parodi et al.).

– Yverdon, 5 octobre, 1 a. c., phot. (J.-C. & M. Muriset, F. Schneider, J. Bruezière).

Afflux inhabituel, qui représente un record annuel. Toutes les observations se situent dans la période normale d'apparition (WINKLER 1999).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (décembre à février)

TG – Bassin d'Ermatingen, 23 décembre, 2 ind.; 29 décembre 2003, 1 ind.; 11 janvier, 2 ind.; 31 janvier, 1 ind.; 24 février 2004, 2 ind. (W. Geiger, G. Sieber, P. & A. Brändli, J. Marschner, E. Weiss et al.).

Il s'agit de la première série d'observations hivernales en Suisse depuis 1990-1991, lorsqu'un oiseau avait hiverné dans ce même site (HEINE et al. 1999).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* (juin à mars)

VD – Chablais de Cudrefin, 13, 18, 20 et 23 juillet, 1 a. c., phot. (M. Schweizer, M. Stierlin et al.); La Sauge VD, 21-22 juillet, 1 a. c. (F. Turrian, M. Schweizer et al.).

Il s'agit d'une des rares données de juillet.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (décembre à février)

LU – Aufschüttele/Lucerne, 10 décembre (T. Weber).

Douzième observation pendant la période hivernale depuis 1975.

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* (+, 26/28, 2/2)

VD – Grandson, 4-7 septembre, 1 a. c., phot. in *Ornis* 5/03: 26 et in *Nos Oiseaux* 50: 278, 2003 (J. Duplain et al.).

ZH – Zurich, 7 septembre, 1 a. c. (R. Gautier).

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (+, 12/12, 3/3)

NE – Le Landeron, 5 janvier (P. Monnier, E. Perrenoud); probablement le même que celui observé le 25 décembre 2002 au Chablais de Cudrefin VD (P. Lustenberger, A. Meyer in SCHWEIZER & MAUMARY 2003)

VD – Paudex, 1^{er} janvier-18 avril, 2 a. c., phot. in *Nos Oiseaux* 50: 72 et 136, 2003, in *Ornis* 2/03: 26 et in *Limicola* 17: 36, 2003 (H. Recher et al.); Prévèrenge, 21 avril, le même ind. (L. Maumary et al.).

ZH – Zurich, 24 février-1^{er} mars, 2 a. c., phot. in *Limicola* 17: 93, 2003 (H. Klopfenstein et al.).

L'observation de Paudex constitue le premier cas d'hivernage en Suisse.



L-Maumary

Aigle criard *Aquila clanga* ad. Retenue de Niederried BE, 17 décembre 2003.



A. Jordi

Vanneau sociable *Chettusia gregaria* et Vanneau huppé *Vanellus vanellus*. Grand Marais BE/FR, 14 mars 2003.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (+, 16/20, 1/1)

TG – Lac de Constance devant Romanshorn, 2 août, ad. (J. Günther).

Il s'agit d'une donnée automnale hâtive, la majorité des Labbes pomarins transitant par la Suisse entre septembre et décembre (contrairement au Labbe parasite, dont le passage culmine en août-septembre) (WINKLER 1999).

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (+, 31/34, 4/4)

BE – Gurten, 28 août, 1 a. c. (P. Lustenberger).

GE – Le Vengeron/Bellevue, 9 octobre, 1 a. c. (M. Rogg).

VD – Préverenges, 21 juillet, 1 ind. de type 2^e été (J. Duplain *et al.*).

– Chablais de Cudrefin, 29 juillet, 1 ind. de type 2^e été (M. Schweizer, T. Roth, M. Zimmerli, B. Herren, M. Stierlin); probablement s'agit-il du même ind. que celui du 21 juillet à Préverenges, raison pour laquelle il n'est comptabilisé qu'une seule fois.

VD – Léman, entre Allaman et Thonon F74, 9

octobre, 1 a. c., phot. (H. Duperrex, J. Duplain, I. Henry, L. Maumary, C. Bornand).

L'observation de juillet concerne probablement un estivant.

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* (+, 43/54, 0)

VD – Complément: Les Grangettes, 16 septembre 2002, 1 a. c. (L. Maumary).

Un complément à l'afflux de 2002 (voir SCHWEIZER & MAUMARY 2003), donc non comptabilisé en 2003.

Labbe indéterminé *Stercorarius* sp.

FR – Estavayer-le-Lac, 13 novembre, imm. (P. Rapin).

SG – Rapperswil, 9 septembre, 1 a. c. (H. Klopfenstein).

Goéland railleur *Larus genei* (1/2, 14/68, 1/2)

VD – Chablais de Cudrefin, 24 mai, 2 ad., dont 1 bagué en couleurs FKD, phot. in *Limicola* 17: 159, 2003 et in *Dutch Birding* 25: 262, 2003 (P. Lustenberger *et al.*).

La Suisse a été de nouveau visitée par l'espèce en 2003. La bague en couleur a permis une nouvelle fois de constater l'origine camarguaise des Goélands railleurs atteignant la Suisse (MAUMARY 2002).

Goéland argenté *Larus argentatus* (mai à août, sous-espèce *L. argentatus argenteus* toute l'année)

Individus à pattes jaunes (0, 3/3, 2/2)

TG – Romanshorn, 12 février, ad. (M. Schweizer).

VD – Ouchy/Lausanne, 14 janvier, ad. (M. Schweizer).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* (2/2, 1/1, 2/1)

SO – Selzach, 8 janvier, ad. (W. Christen).

VD – Yverdon, 12 janvier, ad., phot. in *Nos Oiseaux* 50: 72, 2003 (M. Muriset *et al.*).

Ces deux observations, de même que celle de décembre 2002 au lac d'Inwil BE/SO (SCHWEIZER & MAUMARY 2003) concernent sans doute le même individu. Il ne s'agit que de la 3^e donnée depuis 1900.

Goéland marin *Larus marinus* (hors du lac de Constance)

BE – Brienz, 9 novembre 2003-28 février 2004, ad., phot. (P. Blaser *et al.*).

GE – Pointe-à-la-Bise, 7, 18, 23 et 26 décembre 2003, ainsi que 6 janvier 2004, min. 4 a. c., phot. (J.-É. Liberek, M. Rogg, C. Guex, B. Volet); Pregny-Chambésy, 8 décembre 2003, min. 4 a. c. (M. Rogg).

VD – Léman, entre Buchillon et Thonon F74, 5 janvier, 4 a. c., phot. (I. Henry, J. Duplain, L. Frutig, N. Moduli, M. Muriset).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (51/60, 31/40, 1/1)

VD – Chablais de Cudrefin, 11 juin, ad. (L. Juillerat, M. Pittet).

– *Complément*: Yverdon, 26 juillet 2000, ad. (J.-C. Muriset, S. Antoniazza, C. Roulier, S. Jaquier).

La statistique du nombre de cas et d'individus entre 1900 et 1991 a été contrôlée et corrigée dans le cadre de l'élaboration du livre à paraître *Les oiseaux de Suisse* (MAUMARY *et al. in prep.*).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (16 octobre au 15 mars)

BL – Augst, 20 octobre, ad. (M. Schweizer).

SG – Rapperswil, 17-19 octobre, 1 a. c. (W. Schmid, K. Anderegg).

Sterne arctique *Sterna paradisaea* (14/16, 33/36, 3/4)

BE – Thun, 25-27 mai, ad. (M. Wettstein, M. Käppli, M. Gerber).

VD – Chablais de Cudrefin, 9 juin, 2 ad., phot. (G. Schuler, M. Schweizer, J. Fischer, A. Jordi, M. Ritschard *et al.*).

– St-Sulpice, 16 novembre, 1 a. c. (E. Bernardi, O. Jean-Petit-Matile, B. Yerli, A.-M. Scala, O. Poirier).

VD – *Complément*: St-Prex, 4 août 2002, 1 a. c.; Léman, entre Allaman et Excenevex F74, 10 août 2002, 1 a. c., phot. (E. Bernardi *et al.*).

Le séjour au lac de Thoun est très inhabituel, outre les données plus classiques du Léman et du lac de Neuchâtel.



L. Maumary

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* 1 a. c. Léman, au large d'Allaman VD, 9 octobre 2003.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* (août à mars)

GE – Pointe-à-la-Bise, 3 août, ad. (M. Rogg).
Une des rares données en migration postnuptiale.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (août à mars)

SG – Rapperswil, 9 et 12 septembre, 1 a. c. (H. Klopfenstein).

VD – Chablais de Cudrefin, 12 août, 1 ad. et 1 ind. 1 a. c. (M. Gerber, G. Fischer).

TG – *Complément*: Egnach, 7 septembre 2002, 1 a. c. (D. Bruderer).

Petit-duc scops *Otus scops* (novembre à mars, toute l'année hors des sites de reproduction connus)

BL – Bubendorf, 8 mai, ch. (M. & S. Keller).

TI – Bolle di Magadino, 19 avril, capt., phot. (T. Stalling, D. Matthes, F. Schneider, D. Dorriani).

Deux oiseaux en migration pré-nuptiale.

Martinet pâle *Apus pallidus* (décembre à février, toute l'année hors de Locarno)

TI – Cadenazzo, 6 juillet (A. Huber).

VS – Fiescheralp/Fiesch, 29 juillet, min. 1 ind., phot. (J. Bisschop, R. Mulder, E. Koops).

A part une observation aux environs de Locarno, où niche cette espèce, le Martinet pâle a été observé pour la 2^e fois en Valais, où la 1^{re} apparition date du 19 mai 2001 (L. Maumary, H. Duperrex in MAUMARY 2002).

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (+,17/18, 1/1)

LU – Wauwilermoos, 11-21 mai, phot. in *Ornis* 4/03: 26, in *Limicola* 17: 159, 2003 et in *Dutch Birding* 25: 265, 2003 (H. Hunkeler et al.).

VS – *Complément*: Loèche, 13 juin 2002, phot. in *Nos Oiseaux* 49: 186, 2002 (H. Duperrex, L. Maumary).

Cette espèce est soumise à homologation depuis 2002 seulement (KNAUS & CAVS 2002).

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* (0, 26/46, 8/18)

GR – Churer Rheintal, 9 mars, couple; 6, 12, 21 mai, couple nourrissant à la cavité; 20 juillet f., vidéo (U. Bühler) • 24 mai, couple nourrissant à la cavité, min. 1 juv., vidéo (U. Bühler).



A. Jordi

Sterne arctique *Sterna paradisaea* ad. Chablais de Cudrefin VD, 9 juin 2003.

–Prättigau, 16 mars, f., 12 avril; couple, 18 avril, m.; 26 avril, couple à la cavité; 18 mai, couple nourrissant à la cavité; 3 juin, m. et 1 juv., vidéo (U. Bühler, C. Meier-Zwicky, J. Denking) • 19 avril, m. (U. Bühler) • 26 avril, cavité trouvée; 18 mai, couple nourrissant à la cavité; 23 mai, m., probable échec de la nidification, vidéo (U. Bühler, J. Denking) • 12 novembre, 19 et 27 décembre, 1 m. et 1 f. (U. Bühler).

–Malans, 2 avril, m. (A. Kofler *et al.*).

SG –Rheintal, 25 mai, couple avec min. 2 juv., phot., enr. (B. & L. Keist).

En tout, 5 nidifications certaines en 2003, montrant que l'espèce est maintenant bien établie dans la vallée du Rhin st-galloise, le Churer Rheintal et le Prättigau. On peut s'attendre à une expansion vers l'ouest dans notre pays!

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (août à mars, toute l'année dans les cantons du nord-est de la Suisse: AI, AR, SG, SH, TG)

VS –*Complément*: Martigny VS, 22-23 avril 2001 (H. Duperrex, J. Duplain, I. Henry, L. Maumary, Y. Frutig).

Cette donnée concerne 2001, lorsque l'espèce était encore soumise à homologation dans tout le pays (KNAUS & CAVS 2002).

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* (14/18, 20/27, 2/2)

LU –Aufschütte/Lucerne, 24 octobre (A. Borgula, R. Bryant).

VS –Martigny et Fully, 21-22 mai (H. Duperrex, C. Sinz).

–*Complément*: Riddes, 4 mai 2002 (J.-M. Duflon, H. Duperrex).

L'observation de Lucerne est très tardive, il ne s'agit que de la 2^e donnée d'automne.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (décembre à février, sous-espèces *M. flava feldegg*, *flavissima*, *iberiae* et *lutea* toute l'année)

Individus présentant les caractères de la sous-espèce *M. f. flavissima* (+, 39/42, 0)

VD –*Complément*: Les Grangettes, 24 avril 2002, m. (H. Duperrex).

Aucune donnée de cette sous-espèce n'a été homologuée en 2003, alors qu'elle est signalée en Suisse presque chaque année.

Individus présentant les caractères de la sous-espèce *M. f. feldegg* (+, 29/34, 1/1)

AG –Retenue de Klingnau, 16 avril, m., phot. (E. Weiss, W. Portmann).

Une seule observation de cette sous-espèce, qui n'est pas vue chaque année en Suisse.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (octobre à mars)

VS –Vouvry, 30 mars, ch. (N. Jordan).

Une des rares données de mars de cette espèce qui n'apparaît normalement pas avant mi-avril (WINKLER 1999).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (hors des Bolle di Magadino)

VS –*Complément*: Grône, 28 juin-17 juillet 2002, ch., enr. (H. Duperrex, L. Maumary, C. Sinz).

Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis* (2/2, 6/6, 1/1)

ZH –Greifensee/Schwerzenbach, 13 juillet, ch. (H.-U. Dössegger).

A nouveau une observation printanière de cette espèce orientale. Lors d'une révision (voir p. 238) les trois premières données (2 de 1956 et 1 de 1972) ont été rejetées. La première ne date que de 1991.

Lusciniolite à moustaches *Acrocephalus melanopogon* (+, 10/10, 1/2)

FR –Portalban, 12-13 avril, 1 m. ch. et 1 f. alarmant, 15 avril 1 m. ch. (M. Zimmerli).

Une nidification probable sur la rive sud du lac de Neuchâtel, où la seule preuve de reproduction en Suisse a été apportée en 1981 (WINKLER 1999).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (+, 22/24, 4/4)

GE –*Complément*: Avusy, 5 août 2002, 1 a. c., capt. (B. Lugin, J. Morel, F. Steiner).

LU –Mauensee, 31 juillet (E. & R. Wüst-Graf, H. Schmid, P. Korner).

TI –Bolle di Magadino, 23 avril, capt., phot. (T. Stalling, M. Basen, F. Schneider, D. Matthes, D. Dorriani).

VD –Chablais de Cudrefin, 18 août (D. Arrigo) • 4 septembre (P. Rapin *et al.*).

Deux données en 2003 hors de la rive sud du lac de Neuchâtel, où cette espèce menacée est régulièrement observée.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (novembre au 15 mars)

VD –Les Grangettes, 2 novembre (H. Duperrex).

Le passage de cette espèce est normalement terminé à mi-octobre (WINKLER 1999).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (16 septembre au 15 avril, toute l'année dans le nord-est de la Suisse, cantons AI, AR, SG, SH, TG)

SG –Kaltbrunner Riet, 1^{er} mai, ch. (D. Marques *et al.*).

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*
(55/55, 47/53, 2/2)

GR – Scuol, 11 avril, m. (H.-J. Pflüger).
– Ramosch, 19 mai, m. (R. Wüst-Graf, M. Müller).

Deux données printanières en Basse Engadine.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*
(novembre au 15 mars)

GR – Schluen, 8-9 novembre (V. Oswald).

Le passage de cette espèce se termine normalement à mi-octobre (WINKLER 1999).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (4/4, 1/1, 2/2)

FR – La Berra, 11 octobre, capt., phot. (C. Perroud et al.).

VD – Jouxten-Mézery, 14-15 octobre, phot. in *Nos Oiseaux* 50: 277, 2003 (J.-P. Reitz, L. Maumary, P. Delacréz et al.).

Il s'agit des 6^e et 7^e données pour la Suisse, presque simultanées (BEAUD 2004; REITZ 2004)! Le Pouillot de Hume *Ph. humei*, considéré jusqu'à récemment comme une sous-espèce du Pouillot à grands sourcils, a pu être exclu dans les deux cas.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Individus présentant les caractères de la sous-espèce *Phylloscopus collybita tristis* (1/1, 5/6, 0)

GE – Complément: Avusy, 13 novembre 2002, capt., phot. (B. Lugrin, J.-M. Hayoz).

La sous-espèce *Ph. c. tristis* a pu être attribuée car l'oiseau a été capturé.

Individus présentant les caractères des formes orientales (1/1, 4/4, 0)

VD – Complément: Marais de la Versoix/Chavannes-de-Bogis et Divonne F01, 1^{er}-29 février 1992 (B. Volet).

L'oiseau n'a pas chanté et n'a pas été capturé, raison pour laquelle il est considéré comme un « individu présentant les caractères des formes orientales ».

Gobemouche nain *Ficedula parva* (28/28, 13/13, 5/8)

GR – Schiers, 11 mai, m. ad. ch.; 14 mai, 1 couple; 29 mai et 7 juin, m.; 15 juin, couple et nid avec min. 1 juv.; 12 juillet, 1 couple, 1 ind. 1 a. c. et 1 m. 2 a. c.; 19 juillet, 1 couple et 1 m. 2 a. c. (F. & S. Castelli, V. Zindel, V. Oswald, C. Meier-Zwicky) • 1^{er} juin, m. ch. (U. Bühler).

– Jenaz, 22 juin, 2 m. ch.; 23 juin, 1 m. ch. (U. Bühler).



T. Stalling

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*. Bolle di Magadino TI, 23 avril 2003.

ZH – Chatzensee Allmend/Rümlang, 1^{er} septembre, 1 a. c. (P. Walsler).

Il s'agit de la première preuve de nidification du Gobemouche nain en Suisse !

Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* (septembre au 15 mars, toute l'année hors des sites de nidification connus dans les Grisons et au Tessin)

GR – Zernez, 19-20 avril, m., vidéo (D. Godly).

NE – Le Landeron, 19 avril, m. (D. Arrigo, M. Zimmerli).

TI – Bolle di Magadino, 19 avril, m., capt., phot. (F. Schneider, T. Stalling, D. Matthes).

VD – Chablais de Cudrefin, 21 avril, m. (P. J. & A. Brändli).

Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* (+, 10/10, 4/4)

FR – Chrümml/Ried b. Kerzers, 14 mai, ad. phot. in *Ornis* 4/03: 26, in *Dutch Birding* 25: 265, 2003 et in *Limicola* 17: 161, 2003 (M. Schweizer, P. Petitmermet et al.).

TI – Breganzona, 15-16 mai, phot. (A. Cereda).

– Carona, 8 juin, phot. (B. Sommerhalder).

VS – Agarn, 20 mai, phot. (H. Duperrex).

Plus d'observations que la moyenne en 2003.

Moineau cisalpin x domestique *Passer hispaniolensis italiae* x *P. domesticus*

VD – Compléments: Payerne, 4 décembre 2002, m., phot. (F. Schneider) • 22 décembre 2002, m., phot. (F. Schneider).

Il s'agit très probablement de la descendance du mâle Moineau cisalpin observé en 2000 à Payerne (P. Rapin in PREISWERK et al. 2001).



B. Lugrin

Au premier plan, Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* présentant les caractères de la sous-espèce *Ph. c. tristis*, en comparaison d'un Pouillot véloce *Ph. c. collybita*. Avusy GE, 13 novembre 2002.

Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (9/10, 5/5, 1/1)
JU – Bonfol, 11 octobre, phot. (C. Monnerat, D. Crelier, F. Klötzli, C. & M. Rebetez).

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (16 avril à septembre, toute l'année hors du lac de Constance)
AG – Thalheim, 15-16 novembre, phot. (A. & B. Sutter, T. Stahel, S. Zimmerli, S. Bächli, C. Müller).

Catégorie C

Espèces relâchées par l'homme ou échappées de captivité, ayant formé une population nicheuse autonome. De même, les oiseaux qui proviennent très probablement d'une telle population.

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* (6/6, 31/32, 0)

TG – Complément: Bassin d'Ermatingen, 13 octobre, 28 novembre, 15 décembre 2002, 12 janvier et 15 février 2003, f. ou 1 a. c. puis 2 a. c. (H. Jacoby, B. Porer, W. Leuthold, M. Schneider-Jacoby, F. Sigg).

Vautour moine *Aegypius monachus* (4/4, 1/1, 1/1)
VD – Premier et La Bessone/Lignerolle, 5 août, 1 a. c., phot. in *Nos Oiseaux* 51: 25, 2004 (C. & J.-P. Berney, E. Bourgeois).

A nouveau un Vautour moine en Suisse. Comme celui de 2002 (BAUDAT *et al.* 2003), cet oiseau provenait du programme de réintroduction français.

Catégorie D

Espèces dont l'origine sauvage est possible, mais pas certaine, ou qui ne peuvent être placées dans une autre catégorie pour différentes raisons.

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* (0, 10/2, 0)

BS – Compléments: Bâle, 14 janvier-26 février 2001, m., phot. in *Ornis* 2/01: 26, in *Limicola* 15: 60, 2001 et in *Dutch Birding* 23: 97, 2001 (R. Aye, J.-F. Zweiacker *et al.*) • 18 novembre 2001-1^{er} mars 2002, m., phot. in *Limicola* 16: 38, 2002 (R. Aye, J.-F. Zweiacker *et al.*).

Il n'existe que des données hivernales de cet oiseau.

Catégorie E

Espèces échappées de captivité. Les données de cette catégorie ne sont publiées que lorsqu'elles concernent des espèces appartenant à l'avifaune du Paléarctique occidental ou qu'elles présentent un intérêt particulier.

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus*

AG – Riniken, 5 septembre, phot. (P. Stöckli).

Bernache du Canada *Branta canadensis*

SH – Stein am Rhein, 2 février, présentant les caractères de la sous-espèce *Branta canadensis minima*, phot. (S. & H. Werner, M. Schäfer).

Bernache à cou roux *Branta ruficollis*

SH – Stein am Rhein, 2 février, 7 ind., phot. (S. & H. Werner, M. Schäfer).

Révisions

La plupart des révisions suivantes sont issues des contrôles effectués dans le cadre du livre à paraître *Les oiseaux de Suisse* (MAUMARY *et al.* in prep.).

Puffin cendré *Calonectris diomedea* (1/1, 0, 0)

1865 – Creux de Genthod/Chambésy GE, 15 mai,

2 ind. tirés (ROGET 1866; FATIO 1904), dont 1 f. présentant les caractères de la sous-espèce *Calonectris diomedea diomedea* au Muséum d'histoire naturelle de Genève (C. Weber, L. Vallotton) et 1 m. au Musée d'Arras F (J.-L. Martinet).

Détermination de la sous-espèce du spécimen de Genève.

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* (1/1, 0, 0) 1941–Ermatingen TG, 14 février (BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM 1968), conservé au Museum Stemmler de Schaffhouse.

Cet oiseau a été identifié par erreur comme Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* et publié comme tel (WINKLER 1999). Il s'agit d'une Oie des moissons présentant les caractères de la sous-espèce *Anser fabalis rossicus* (L. Maumary, L. Vallotton, P. Knaus). La dernière donnée de l'Oie à bec court de 1979 est également en cours de révision.

Autour des palombes présentant les caractères de la sous-espèce *Accipiter gentilis buteoides* 1965–Ferenberg BE, 15 novembre (GLUTZ VON BLOTZHEIM *et al.* 1971).

La description insuffisante et l'absence de spécimen ne permettent pas d'inclure cette sous-espèce dans l'avifaune suisse.

Faucon pèlerin présentant les caractères de la sous-espèce *Falco peregrinus calidus* (1/1, 0, 0)

1943–Neeracherried ZH, 14 novembre, ad. (GLUTZ VON BLOTZHEIM *et al.* 1971).

1950–Neeracherried ZH, 12 février-30 mars, ad. (GLUTZ VON BLOTZHEIM *et al.* 1971).

Les descriptions insuffisantes et l'absence de spécimen ne permettent pas d'homologuer ces deux observations.

Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis* (2/2, 6/6, 1/1)

1956–Märwil TG, 2 juin, capt. (BRASCHLER 1956).

La description est insuffisante pour étayer une première donnée suisse.

1956–Cossonay VD, 3 août, trouvée morte, conservée au Harrison Zoological Museum, Sevenoaks, Kent, England (HARRISON 1958; GÉROUDET 1966).

Cet oiseau a été identifié par erreur comme Locustelle fluviatile et publié comme telle (WINKLER 1999). Un nouvel examen du spécimen a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une Locustelle luscinioïde *Locustella luscinioides*.

1972–Col de Bretolet VS, 14 septembre, capt. (Winkler 1973), conservée au Naturhistorischen Museum de Bâle.

Cet oiseau a été identifié par erreur et publié comme Locustelle fluviatile (WINKLER 1999). Il

s'agit aussi d'une Locustelle luscinioïde.

Suite à cette révision la donnée des 28-30 mai 1991 à Niederrüti/Winkel ZH (S. Pike *in* UNDELAND *et al.* 1993) devient la première donnée suisse.

Hypolaïs bottée présentant les caractères de la sous-espèce *Hippolais caligata caligata* (0, 2/2, 0)

1998–Chablais de Cudrefin VD, 7 octobre (SCHWEIZER 2000).

Attribution de la sous-espèce lors cette révision.

Annexe

Observations non homologuées

A moins d'une erreur d'identification manifeste, le motif de refus est souvent une documentation insuffisante. La description doit être d'autant plus complète si elle n'est pas appuyée par des croquis, des photographies ou un enregistrement, notamment pour les espèces et sous-espèces vues moins de cinq fois en Suisse.

2003

Plongeon imbrin *Gavia immer*: Zug ZG, 11 janvier.

• **Canard à front blanc** *Anas americana*: Fanel BE, 28 avril, m. Il s'agissait d'un **Canard de Chiloé** *Anas sibilatrix*.

• **Erismature rousse** *Oxyura jamaicensis*: Céligny GE, 21 janvier et 8 février, m.

• **Vautour indéterminé** *Gyps sp./Aegypius sp.*: Yvonand VD, 15 avril.

• **Buse féroce** *Buteo rufinus*: Burgdorf BE, 28 août.

• **Buse pattue** *Buteo lagopus*: Masein GR, 29 septembre-2 octobre; Bad Ragaz SG, 16 février;

Nuolener Ried SZ, 6 janvier, f. ad.

• **Aigle botté** *Hieraaetus pennatus*: Gurten BE, 13 avril, morphe sombre; Bienne BE, 15 avril, morphe sombre;

Wahlen BL, 30 mai; Mels SG, 12 septembre.

• **Faucon kobez** *Falco vespertinus*: Schmitten FR, 27 novembre, m. ad.

• **Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos*: Chrümli/Ried b. Kerzers FR, 5 mai.

• **Bécassine double** *Gallinago media*: retenue de Klingnau AG, 1^{er} avril.

• **Chevalier gambette** *Tringa totanus*: Jona SG, 26 février.

• **Mouette atricille** *Larus atricilla*: delta de la Reuss UR, 23 juillet, 3 a. c.

• **Mouette de Franklin** *Larus pipixcan*: Freienbach SZ, 30 septembre, ad.

• **Goéland marin** *Larus marinus*: Pully VD, 19 janvier, ad.

• **Sterne caugek** *Sterna sandvicensis*: Hitzkirch LU, 11 mai, 38 ind.

• **Petit-duc scops** *Otus scops*: St-Aubin VD, 8 mai.

• **Traquet oreillard** *Oenanthe hispanica*: Chablais de Cudrefin VD, 17 septembre, f. ad.; Chandolin VS, 21 juin, m. ad.

• **Bouscarle de Cetti** *Cettia*

cetti: Häusermoos BE, 11 septembre. • **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus*: Greifensee/ Schwerzenbach ZH, 16 novembre, 2 ind. • **Gobemouche à collier** *Ficedula albicollis*: Brigue VS, 18 juillet, m. • **Roselin cramoisi** *Carpodacus erythrinus*: Nuolener Ried SZ, 15 novembre, gris. • **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana*: Sargans SG, 16 mars, m. ch.

2002

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*: Romanshorn TG, 13 novembre.

1996

Bondrée apivore *Pernis apivorus*: Ollon VD, 2 novembre.

Remerciements – Nos vifs remerciements s'adressent en premier lieu aux observatrices et observateurs qui ont consciencieusement rempli leurs protocoles et qui, parfois même pour des espèces plus communes, ont fourni des descriptions détaillées. Ces descriptions, dessins ou photographies facilitent grandement le travail de la Commission en ne laissant planer aucun doute sur l'identification. La CAVS est reconnaissante à Andrea Corso pour ses conseils, ainsi qu'à Bernard Volet pour l'excellente tenue du secrétariat. Dans le cadre de la révision des données de Locustelles fluviatiles, le *Harrison Zoological Institute* de Sevenoaks, Kent, England, nous a permis d'examiner le spécimen en sa possession. Les autres membres de la CAVS ont fait une lecture critique du manuscrit. Enfin, nous sommes redevables à la société Carl Zeiss, qui subventionne la publication de ce rapport.

Bibliographie

- BAUDAT, J., B. POSSE, R. ARLETTAZ & E. REVAZ (2003): Un Vautour moine *Aegypius monachus* des Grands Causses (Massif Central, France) séjourne six semaines dans les Alpes valaisannes et haut-savoïardes. *Nos Oiseaux* 50: 129-134.
- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1968): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 2. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a.M.
- BEAUD, M. (2004): Capture d'un Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* à La Berra, dans les Préalpes fribourgeoises. *Nos Oiseaux* 51: 178-179.
- BRASCHLER, K. (1956): Ein Schlagschwirl bei Märwil (TG). *Ornithol. Beob.* 53: 203.
- FATIO, V. (1904): *Faune des vertébrés de la Suisse. Vol. 2, Histoire naturelle des oiseaux, 2^e partie*. Georg & Co., Genève & Bâle.
- GÉROUDET, P. (1966): La Locustelle fluviatile en Suisse romande. *Nos Oiseaux* 28: 258.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1971): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 4. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a.M.
- HARRISON, J. M. (1958): River Warbler in Switzerland. *Bull. Brit. Ornithol. Club* 78: 126.
- HEINE, G., H. JACOBY, H. LEUZINGER & H. STARK (1999): *Die Vögel des Bodenseegebietes*. *Ornithol. Jahresh.* Baden-Württ. 14/15.

Rare birds and unusual observations in Switzerland in 2003 – In 2003 the Swiss Rarities Committee examined 182 reports of 80 species, 84% of which were accepted. The highlights in the year 2003 were the first record of the Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva* and the first breeding record of the Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*. Other interesting sightings included the fourth visit of the same colour-ringed Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber* to the Chablais de Cudrefin, the expansion of White-backed Woodpecker *Dendrocopos leucotos* in eastern Switzerland with five breeding records, the first and second record of a Booted Eagle *Hieraetus pennatus* of the dark morph, the third record of the Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*, the fourth record of both Northern Gannet *Sula bassana* and Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* as well as a small influx of Pectoral Sandpipers *Calidris melanotos* with five observations, and the first overwintering Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius*. At the end of 2003, the Swiss list comprises 390 species in categories A, B (birds of wild origin) and C (introduced species), 383 of which have been recorded since 1900. Seven species of uncertain origin remain in category D (doubtful origin). In the text, the three figures after the German and scientific names refer to the number of records/individuals, 1900-1991, 1992-2002 and in 2003, respectively. The species are listed systematically, within the species by alphabetic order of the cantons and by date. Detailed information is given as follows: location, date(s), number of individuals (one individual if not specified), age and sex if known, available documentation (photographs, video, skins) and in brackets the name(s) of the observer(s).

- KNAUS, P. & LA COMMISSION DE L'AVIFAUNE SUISSE (CAVS) (2002): Liste des espèces soumises à homologation en Suisse: révision 2002. *Nos Oiseaux* 49: 47-56.
- MAUMARY, L. (2002): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2001. 11^e rapport de la Commission de l'avifaune suisse. *Nos Oiseaux* 49: 229-248.
- MAUMARY, L., L. VALLOTTON & P. KNAUS (*in prep.*): *Les oiseaux de Suisse*. Station ornithologique suisse & Nos Oiseaux.
- MOSIMANN, P. & L. MAUMARY (1993): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1992. Rapport de la Commission de l'avifaune suisse (CAVS). *Nos Oiseaux* 42: 211-223.
- POSSE, B. (2001): Un Fou de Bassan *Sula bassana* dans les Alpes suisses. *Nos Oiseaux* 48: 209-210.
- PREISWERK, G. (1999): Erster Nachweis eines Basstölpels *Sula bassana* in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 96: 134-135.
- PREISWERK, G., P. KNAUS & L. MAUMARY (2001): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2000. 10^e rapport de la Commission de l'avifaune suisse. *Nos Oiseaux* 48: 257-276.
- REITZ, J.-P. (2004): Un Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* dans la périphérie ouest de l'agglomération lausannoise (Suisse). *Nos Oiseaux* 51: 175-177.
- ROGET, M. (1866): *In*: Extraits des procès-verbaux des années 1865 et 1866. *Bull. soc. ornithol. Suisse* 1 (2^e partie): 107.
- SCHWEIZER, M. (2000): Der Buschspötter *Hippolais caligata*, eine neue Art in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 97: 249-252.
- SCHWEIZER, M. & L. MAUMARY (2003): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2002. 12^e rapport de la Commission de l'avifaune suisse. *Nos Oiseaux* 50: 261-276.
- UNDELAND, P., H. LEUZINGER & L. MAUMARY (1993): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1991. *Nos Oiseaux* 42: 29-38.
- VOLET, B., H. SCHMID & R. WINKLER (2000): *Liste des oiseaux de la Suisse/Liste der Vogelarten der Schweiz/Elenco degli uccelli della Svizzera/Checklist of the Birds of Switzerland*. Nos Oiseaux, Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux.
- WINKLER, R. (1973): L'activité ornithologique au col de Bretolet en 1972. *Nos Oiseaux* 32: 33-43.
- WINKLER, R. (1999): *Avifaune de Suisse*. Nos Oiseaux suppl. 3.

Publications relatives à des rapports antérieurs

Cet article avait été annoncé mais n'était pas encore publié au moment du rapport précédent:

- HAURI, R. (2004): Die Mantelmöwe *Larus marinus* als Wintergast am Brienzensee. *Ornithol. Beob.* 101: 340-345.

Georges PREISWERK, Niederholzstrasse 75, CH-4125 Riehen, courriel: georges.preiswerk@tiscali.ch

Lionel MAUMARY, Praz-Séchaud 40, CH-1010 Lausanne, courriel: lionel.maumary@oiseau.ch



La publication du rapport de la Commission de l'avifaune suisse est soutenue par Carl Zeiss SA, Feldbach